

D E

PULSIBUS ac URINIS
FASCICULUS
INDICATORIUS,

Omni perutilis, qui se *Medi-*
cinae dicat:

five,

MEMORIALE,

h. e.

SUCCINCTI CANONES
PRACTICI,

ad *Praxin Medicam* facilitandam,
Collecti sibi, atque aliis con-
scripti,

a

CONRADO ZUMBAG
DE KOESFELT,

Med. Doct., Polyatr. Lugd. Bat., atque ibi-
dem Colleg. Med. ad res Obstetr. ac
Chirurg. Assess., Soc. Reg. Bo-
russ. Sodali.

LUGDUNI BATAVORUM,
Apud GERARDUM POTVLIIET
Anno 1741.

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30780688>

V I R I S

*Clarissimis , Celeberrimis atque
Experientissimis ,*

A C A D E M I A E

Lugduno - Batavae ,

Luminaribus Fulgentissimis ,

D. HERMANNO OOSTER-
DYK SCHACHT ,

A. L. M. Phil. & Med. Doctori,
Medicinae Theoreticae & Pra-
cticae , atque Collegii Practici
Professori ; Colleg. Theol. Il-
lustr. & Praepot. D.D. Ordin.
Holl. & Westfris. , quod Lei-
dae est , Med. Ordin. ; Colleg.
Pharmaceut. Praefidi &c.

**D. BERNHARDO SIEG-
FRIED ALBINO,**

Med. Doctori ; Anatomiae at-
que Chirurgiae Professori, Col-
leg. Chirurg. ac Med. ad res
Obstetr. Praefidi &c.

D. ADRIANO VAN ROYEN,
Med. Doctori; ejusdemque Bo-
tanices & Collegii Practici Pro-
fessori ; Societ. Londin. socio
&c.

**D. HIERONYMO DAVIDI
GAUBIO,**

Med. Doctori ; Medicinae ac
Chemiae Professori &c.


Fautoribus meis Honoratissi-
mis, in Arte Phoebea Con-
summatissimis, Felicissimis,
Dignissimis, hasce paginu-
las Practicas, seque vene-
rabundus D. D. D.

Author.

CAN-

CANDIDO LECTORI

Salutem.

 uamquam parvo in hoc fasciculo, exarata inveniuntur, rudi Minerva, praecepta, quibus magna volumina onerare, fas esset: veruntamen omnis dabit, necesse est, arti, atque memoriae labili, heu nimium! succurrendum esse semper, quantum fieri possibile, in hoc oceano opinionum; parvo hoc melius fiet volumine.

Fateor oportet, librorum scribendorum nullus est finis; hic exiguus, aspectu novus vero, prodit iterum codex: concedo novi sub Sole esse nihil, mibique nova scribere, neutiquam assumo.

Disposui, elegi atque collegi, quantum in me fuit, necessaria Praxi clinicae; memoriae mandanda, ea mihi accommodavi: nec inutilis hic labor fuit, redundavit potius in me & mihi commissis; atque commode cum hisce me habui. Itaque in exili spatio, multa comprehendere, me conatum fuisse, lubens fateor & spero.

Verum enim vero, maximi moliminis, tractatu vero lubrica, cum

*sit haec materia : ratus autem ,
Publico inservire , intentum esse
debere , unumquemque hominem ac
civem ; non abs re fore , nec in
malam interpretatum iri partem ,
confisus , hocce compendium publi-
ci juris facere. Perutile mihi fuit
semper , plurimis tale futurum ,
avide optarem.*

*Facile videbit , perlegendo , ae-
quus Lector , me fanthem hic non
fuisse , de ulla Theoria vel Insti-
tutione medica : me solum propo-
suisse Practicae generalia , scitu
summe necessaria ; atque ea , quae
Medici , Praxin , quantum in iis
est , cum successu , summo Medi-
co duce , exercere volentes , sibi
infixa & praesentia habere de-
bent.*

Similiter, consummatis in hac desiderabili arte Apollinea, haec scripta nolo, sed excolendis, consummandisque natis Medicorum. Ad forte proficuum futurum iis, qui utilissimas doctissimasque instructiones Nosocomii (cui per plurimos annos medicatus fui) frequentant.

Quae cum ita sint, non habeat quis, rogo, quod de pagellarum angustiis conqueratur. Charta pura (quod idem feci) mixtae paginae, admittent uniuscujusque facilem ac doctam auxesin. Nec minus, additis sub fine, Medicamentorum officinalium armamentario, & quam brevissime, Viribus & Dosibus, exsurget compendium, Praxi quotidiana adaptandum satis,

tis , atque memoriae accommodatum.

Morborum Idea , Diagnofis , Prognofis , & sexcenta alia , hic praefupponuntur ; ufus & applicatio Medicaminum ſubintelligitur.

Pauca ſolummodo nominavi Medicamenta , in his, Auguſtana & aliis pharmacopoeis reperienda : nullas propoſui Formulas ab unoquoque , pro re nata , componendas.

Pauca AETiologica adduntur: plurima alibi petenda , inſtituto noſtro haud idonea , omittuntur , brevitatis ſtudio.

Quae observarunt antiqui & hodierni Doctores, Medicis operam dantes (ob innumerabilem nominum seriem, silentio hic praetereundi) inter quos Pater & Praeceptores mei, atque ipse ego, breviter proponere, ac interconciliare conatus fui.

Qua de re, exiguo includere spatio, quod plurimis libris continetur, & sic reminiscantiae multa dare, allaboravi.

Hoc vero opus, hic labor est. Quid ergo? nullus codex scriptus fere, quin bonum & utile aliquod contineat: ast, probo dolor! maximum quandoque ac prolixissimum volumen, vix paginam veritatis,
re-

*realitatis & utilitatis continet. O
utinam, paucis, multa salutaria
dicerem, atque omnes hae paginu-
lae, demptis adhucdum superfluis,
verae, reales, ac utiles essent!
Intentio est: periculum feci. Im-
mo, in magnis quandoque voluisse
sat est.*

*Tandem, si arrideat labor hic
meus, nec inutilis Tibi videtur
B. L., plura, quae adhucdum abs-
que ordine dispersa, in Medicis,
Mathematicis, ac Philosophicis, a
me elaborata habentur, si Deus
det vires, ordinare, ac Tecum
communicare, non deero. Interim
fruere his, cum benevolentia soli-
ta, ex animo, atque benigniter
corrigas & condones errata, sub-
mis-*

X o X

*misſe peto : omnium namque ha-
bere memoriam & penitus in nul-
lis errare , divinitatis , non mor-
talitatis eſt. Vale.*



X o X



SYNOPSIS

atque

IDEA GENERALIS

OPERIS.

PROLOGUS pagina I

CAPUT I. de *PULSIBUS*. 4

Pars I. *PULSUUM* *Diagnos*
cialis, ex singulis *Morbis* in
specie desumpta. *ibid.*

Pars

Pars II. *PULSUUM* *Diagnosis generalis* a *Tactu & sensatione*. 14

CAPUT II. de *URINIS*. 14

Pars I. *UROSCOPIUM* *particulare*, in quo *URINAE*, earumque conditiones variae, pro singulis *Morbis* in specie describuntur. *ibid.*

Pars II. *UROSCOPIUM* *universale*, quod ex *URINIS* *Morbos*, earumque *Causas* indicat. 37

CAPUT III. de *UNIVERSALIUM* *USU*. 62

Pars I. *Morbi*, quibus *PURGATIO* convenit. *ibid.*

II. — quibus *VOMITORIA* competunt. 75

III.

III. ——— quibus *SUDORIFERA* ac *DIAPHORETICA* conducunt. 85

IV. ———, quibus *DIURETICA* inferviunt. 96

V. ———, ubi *VENAE SECTIO* convenit. 101

VI. ———, quibus *CLYSTERES* opitulantur. 112

VII. ———, quibus *OPIATA* &c. succurrunt. 118

VIII. ———, quibus *VESICATORIA* &c. conveniunt. 128

IX. ———, quibus *PTTALISMUS* &c. prodest. 132

Cum hic liber ubique index sit, specialiorem apponere, abs re fore arbitror.






ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ

GENERALIA

Praxi maxime inservientia.

PROLOGUS.


 edicus medendo occupatus, explorabit statim, naturam PULSUS, ceu obvium & primum signum *Pathognosticum*, externe atque facile cognoscendum. *Excretorum* vero, nullum universalius suppetabit, *Morbi & Humor*um plerumque conditionem internam, mechanicae nostrae molis, quam UROSCOPIUM. Quae cum ita sint, haec duo pertractare,

A

re,

re, brevibus, ordine alphabetico, animus est.

Certiores vias, ad *Diagnosin* & *Prognosin* formandam, cum plurimi acclament, meliorem nullam inveniri; hinc eam non posse satis inculcari, expertus, dicam, necesse est.

Ut veruntamen completum aliquo modo opus exhibeatur, ratus, **THE-RAPEUTICA** quaedam esse nec tendam; ea, paucis, capite tertio subiungam.

Tripartitum sic, totum opus proponitur. In hoc maxime nitendum, ea advocare, quae maximi momenti, ac in arte practica, principalia censentur esse non solum, sed revera sunt: nec laudare ea, quae diversa opinione hinc inde trahuntur, atque varia aegri somnia adducere, sed probatis authoribus, & quod summum est, ipsa indubitata atque fida experientia, compertum semper.

De his iudex legitimus est: qui non pessundedit, Theoriam, huic operi & praxi necessario praesuppositam, me-

dicam ; nec solum eam, sed abundare & instructus is esse debet , scientiis prae-requisitis.

Intelligendum, hic vero, quid PUL-SUS , quid URINA fatagunt : ac ne quis aeger medendo magis aegrescat, indicatum ponitur Capite III. de U-NIVERSALIUM USU , sancitumque sibi habere ista, Medicus debet.

Ex his tribus , infelix oportet sit in sanando , qui omittit , considerando , unum ; nisi sagax natura , cui, absque Medico , potiora debemus , succurrat. Omni fanna vero dignus hic habendus, qui, quanquam prudentissimus ac accuratissimus in praefatis observator , sibi honos deberi , sanando , putat : Natura namque Medicus, Medicus minister tantum.


Conferre pedem, ad ordine plerum-que primum , in inquirendo & facien-do , ad P U L S U U M D I A G N O S I N nempe , jubeor.



CAPUT I.

DE

PULSIBUS.



PARS I.

PULSUM.

*Diagnosis specialis, ex singulis mor-
bis in specie desumpta.*

ABORTUS. Palpitatio cordis ut-
plurimum ; adsunt rigores &
horrores ; nec minus , subitaneae
Phlogoses reciproce , atque tremores.
ANGINA. *PULSUS* tensione quadam
praepeditus est & convulso similis ;
magnus & undosus, ut *PULSUS Pe-
ripneumonicorum* : quicunque vehe-
menter ex illis suffocantur , habent
parvum & rarum ; ubi jam vitam
agunt , crebrum & inaequalem.

APO-

APOPLEXIA. *PULSUS* quandoque est inaequalis intermittens, magnus & languidus, quamvis nonnunquam & celer.

ARTHRITIS. *PULSUS* plerumque frequentior & minor, aliquando major; inconstans vero.

ASCITES. Est parvus crebrior subdurus *PULSUS*, cum quadam tensione.

CACHEXIA. *PULSUS* sunt inaequales, parvi, frequentes & debiles; palpitatio cordis, corpore in altum sublato.

CARDIALGIA. *Syncope* aliquando supervenit; inconstans.

CHLOROSIS. Quandoque celer & frequens *PULSUS*; palpitatio cordis, corpore exagitato: sic *PULSUS* in arteriis temporum; ut & inaequalis, & varius.

CHOLERA. *PULSUS* non raro parvus & inaequalis. Nec minus, est frequens & parvus, quem sequitur intermittens. *PULSUS* debilis, & palpitatio cordis &c. Mortem mi-

nantur. *Celer*, frequens interdum & parvus, animi deliquia.

EPHIALTES. Cordis tremor, post expergefactionem perseverans, malus admodum.

FEBRIS *in genere*. *PULSUS* celerior, & ut plurimum simul etiam frequentior. *PULSUS* debilis dubii eventus, praesertim, si simul intermittens: *PULSUS* magnus & aequalis, cum symptomatum ingravescentia & pravitate, melior est & tutior, quam debilis, cum symptomatibus mitioribus, hic enim saepe funestus. Major & vehemens, boni, e contra parvus ac debilis, mali: durus malus, saepe Convulsionum & Deliriorum prodromus; mollis semper bonus, & undosus, imminentis sudoris nuncius.

FEBRIS CONTINUA ARDENS.

PULSUS debilis, dubii eventus praenuncius.

HECTICA *simplex*. *PULSUS* parvus frequens & celer. Frequens & celer & in dies minor. *PULSUS* celer,

ler, frequens, parvus, debilis, durus.

LENTA *primaria*. *PULSUS* continuo frequens, celer, magnitudine & vehementia moderatus, ad parvitatem tamen declinans.

QUARTANA CONTINUA. Tardus initio *PULSUS* atque rarus; post validior, crebrior, valde inaequalis.

QUOTIDIANA CONTINUA. *PULSUS* rarior: sic tardior & minor.

TERTIANA CONTINUA. *PULSUS* valde & frequens & velox.

SYNOCHUS SIMPLEX. *PULSUS* magnus, aequalis, frequens, plenus. *PULSUS* celer & frequens, aliquando validus & magnus, non tamen inaequalis, aut inordinatus.

SYNOCHUS *putrida*. *PULSUS* non solum magnus & frequens, ac non raro inaequalis, sed *systole* etiam velocior *diastole*.

FEBRIS INTERMITTENS.

QUARTANA. *PULSUS* rarior & tardior, quam in reliquis febribus;

PULSUS primitus frequentior, & semper debilis.

QUOTIDIANA. *PULSUS* parvus, rarus ac tardior.

FEBRIS MALIGNA & PESTILENTIALIS. *PULSUS* in principio quandoque naturali similis, in progressu, & augmento morbi, frequens parvus, debilis & inaequalis. *PULSUS* inordinatus inaequalis & contractus, praesertim si a principio debilis appareat. *PULSUS*, sanorum. *PULSIBUS* similes, admodum periculosi. *PULSUS* in magnitudine constans & aequalis, bonae spei; si & inordinatus, inaequalis, periculum portendit, praesertim si ab initio talis. *PULSUS*, initio saepe naturali pulsui similis, vel non multum discrepans, subito tamen debilis ac parvus reddi solet. Interdum mox initio *PULSUS* est frequens, debilis, parvus, ac invalescente morbo, multis modis inaequalis.

In genere, ubi in *Febre*, quae plus minusve ardentem simulat, *PULSUS*

SUS est parvus, ibi certo colligendum, subesse malignitatem: qui magis aequalis est *PULSUS*, & consuetum eundem servat tenorem, eo melius: inordinatus vero inaequalis, & quasi contractus, periculosus, praefertim in principio. Imprimis vero, quo major est *PULSUS*, eo melior; quo minor, eo deterior.

FLUOR ALBUS *Mulierum*. Cordis palpitatio.

FUROR UTERINUS. *PULSUS* facilis mutatio. Parvus, debilis, tardior, frequentior vero in cogitationibus venereis.

HYDROPS. *PULSUS* est parvus, crebrior, subdurus, cum quadam tensione.

HYPOCHONDRIACUS AFFECTUS. *PULSATIO* in sinistro hypochondrio aliquando percipitur, nonnunquam cordis palpitatio.

PULSUS interdum rarus, tardus aliquando, sic frequens & fortis cordis palpitatio.

PULSATIONES circa regionem hypochondri-

pochondriorum, imprimis circa lumbos & regionem lumborum superiorem, cordis palpitatio.

HYSTERICA PASSIO. *PULSUS* interceptio, quandoque intermittens, interdum *Syncope*; quandoque extra paroxysmum, cordis palpitatio. In ipso paroxysmo, pulsus imminuitur, quandoque aboletur. In hypochondrio utroque, praesertim sinistro, aliquando percipitur *PULSATIO*. Item, sensim imminutus, aut abolitus.

LETHARGUS. *PULSUS* frequentes & magni.

LIPOTHYMIA : fere ut in *Syncope*. *PULSUS* frequenter ac subito mutatur, dum imminet; praesente jam, *PULSUS* rarissimus formicans, obscurus, tandemque abolitus. *PULSUS* interdum nullus, saepius rarus, obscurus & quasi abolitus plane. Minor & debilis, in morbo.

MANIA. *PULSUS* magnus, velox & vehemens, signum proclivitatis ad maniam.

MORBILLI vide *Variolae*.

PARALYSIS. *PULSUS* in malo consumato languidus, tardus, parvus, quandoque nullus. *Febris* tremorve superveniens, vulgo bona censetur.

PHRENITIS. *PULSUS* parvus, durus, celer & frequens, nonnihil undosus. Sic celer frequens & magnus.

PHTHISIS. *PULSUS* frequentior & debilior, post pastum celerior. *PULSUS* rarus, debilis, cum respiratione difficili, & tussi vehementi, Vitam in periculo esse testantur. *PULSUS* semper celer, frequens, plus minusve parvus, observari solet in hoc morbo.

PLEURITIS. *PULSUS* durus & ferratilis. Parvus frequens & valde durus *PULSUS*, lethale signum. Sic, *PULSUS* frequens, celerrimus, etiam mollis, inaequalis, intermittens, aut recurrens aut bipulsans: parvus vero, crebrior, durus atque ferratus, Mortem praenuntiat. In *Pleuritide* ac in *Pleuropneumonia* vel *Peripneumonia* *PULSUS* frequens, celer,

ler, magnitudine plus minus moderatus; in progressu parvus. In *Pleuritide*, specialiter durus & ferratilis, vel *Peripneumonia*.

PLEUROPNEUMONIA. PULSUS magnus, languidus, mollis, subinde aequaliter durus, inaequalis; interdum vero intermittens, intercurrens, undosus, vermicularis.

SCORBUTUS. PULSUS saepe sinistri hypochondrii, palpitatio cordis. Caeterum *PULSUS* varius, nunc debilis & inaequalis, ac fere formicans; nunc magnus & durus, absque inflammationis signo; imminente animi diliquio saepe, aliisque angustiiis, *PULSUS* major ac fortior. *PULSUS* in *Hypochondriacis* quandoque intermittit, in *Scorbuticis* vero, inprimis ut sic, admodum varius, subinde parvus ac debilis, ut aeger omni momento, quoad *PULSUM*, videatur exspiraturus; sed si non alia symptomata adsint? non terreatur Medicus.

SYNCOPE vide *Lipothymia*. *PULSUS* mox abolitus.

VARIOLAE & *Morbilli*. *PULSAT*
IONIS sensus, in fronte & tem-
pore. *PULSUS* citatior, qui saepe in
arteriis temporum observatur, non-
nunquam cordis palpitatio. Sic *PUL*
SUS celer, frequens, vehemens, du-
rus, plus minus magnus, vel par-
vus, *PULSATIO* item, in dorsi spina
& similia.

Pauca haec, de *PULSUUM* spe-
ciali *Diagnosi* sufficiunt: principaliora
haec memoriae mandari facili negotio
possunt; atque inde, ceu promus con-
dus, plurima elicire, fidelis Naturae
observator Medicus, capax erit; gau-
det enim haec maxima simplicitate: est
hoc praeclarum munus ipsius Naturae,
imitandum si possit!





P A R S II.

P U L S U U M.

*Diagnosıs generalis, a Tactu &
Sensatione.*

ABOLITUS. vide *LIPOTHYMIA*,
PARALYSIS, *SYNCOPE*.

AEQUALIS. vide *FEBRIS* *maligna*,
Synochus.

BIPULSANS. vide *PLEURITIS*.

CELER. v. *APOPLEXIA*. *CHLO-*
ROSIS. *CHOLERA*. *FEBRIS* *ar-*
dens. *SYNOCHUS*. *HECTICA*

lenta. *HYDROPS*. *MANIA*.

MORBILLI. *PLEURITIS*.

PHTHISIS. *VARIOLAE*.

CONTRACTUS. v. *FEBRIS* *mali-*
gna.

CREBER. v. *ANGINA*. *ASCITES*.

QUARTANA *continua*. *MANIA*.

PLEURITIS.

DEBILIS. v. CACHEXIA. CHOLERA. FEBRIS *ardens*, *Hectica*, *Quartana*, *Intermittens*, *Maligna*. FUROR *uterinus*. LIPOTHYMIA. PHTHISIS. SCORBUTUS.

DURUS. v. ASCITES. FEBRIS. HECTICA. HYDROPS. MORBILLI. PHRENITIS. PLEURITIS. PERIPNEUMONIA. SCORBUTUS. VARIOLAE.

FORMICANS. v. LIPOTHYMIA. SCORBUTUS.

FORTIS. v. HYPOCHONDRIACUS *affectus*. SCORBUTUS.

FREQUENS. v. ARTHRITIS. CACHEXIA. CHLOROSIS. CHOLERA. FEBRIS, *Synochus simplex* & *putrida*, *Ardens*, *Hectica*, *Lenta*, *Continua*, *Maligna*, *Quartana*, *Intermittens*. FUROR UTERINUS. HYPOCHONDRIACUS *affectus*. LETHARGUS. MANIA. MORBILLI. PLEURITIS. PHTHISIS. VARIOLAE.

FRONTIS *Pulsationes*, in VARIOLIS & MORBILLIS.

HYPOCHONDRII finistri *Pulsatio*,
in *passione HYPOCHONDRIACA*.
SCORBUTO.

INAEQUALES. v. *ANGINA*. *APO-
PLEXIA*. *CACHEXIA*. *CHLO-
ROSIS*. *CHOLERA*. *FEBRIS*.
Synochus putrida. *Quartana*, *Con-
tinua*, *Maligna*. *PLEURITIS*.
PERIPNEUMONIA. *SCORBU-
TUS*.

IMMINUTUS in *HYSTERICA* *pas-
sione*.

INORDINATUS. v. *FEBRIS* *ma-
ligna*.

INTERCEPTUS, in *HYSTERICA*
passione.

INTERMITTENS. v. *APOPLEXIA*.
CHOLERA. *FEBRIS*. *HYSTE-
RICA* *passio*. *PLEURITIS*. *PLEU-
ROPNEUMONIA* vel *PERI-
PNEUMONIA*.

LANGUIDUS. v. *APOPLEXIA*.
FEBRIS. *Quartana continua*. *PA-
RALYSIS*. *PERIPNEUMONIA*.
LUMBORUM *Pulsatio*, in *HYPO-
CHONDRIACO* *affectu*.

MA-

MAGNUS. v. ANGINA. APO-
 PLEXIA. ARTHRITIS. FEBRIS,
Synochus simpl. & Putr., maligna.
 LETHARGUS. MANIA. PHRE-
 NITIS. PERIPNEUMONIA
 SCORBUTUS.

MODERATUS. v. PLEURITIS.
 FEBRIS *Lenta. Synochus.* MOR-
 BILLI. VARIOLAE.

MINOR. v. ARTHRITIS. FEBRIS,
Quotidiana continua, maligna. LI-
 POTHYMIA

MOLLIS. v. FEBRIS. PLEURI-
 TIS. PLEUROPNEUMONIA.

MUTATIO *frequens.* v. FUROR
 UTERINUS. LIPOTHYMIA.

NATURALI *similis.* v. FEBRIS *ma-
 ligna.*

OBSCURUS in LIPOTHYMIA.

PALPITATIO *cordis.* v. ABOR-
 TUS. CACHEXIA. CHLORO-
 SIS. CHOLERA. FLUOR AL-
 BUS. HYPOCHONDRIACA
passio; item HYSTERICA. SCOR-
 BUTUS. VARIOLAE & MOR-
 BILLI.

PARVUS. v. *ANGINA. ASCITES. CACHEXIA. CHOLERA. FEBRIS, Hectica, Lenta, Continua, Quotidiana, Intermittens, Maligna. FUROR UTERINUS. HYDROPS. PARALYSIS. PHRENTIS. PLEURITIS. PHTHISIS. SCORBUTUS.*

PLENUS. v. *SYNOCHUS simplex.*

RARUS. v. *ANGINA. FEBRIS Quotidiana continua, Quartana continua; Quotidiana & Quartana intermittens. HYPOCHONDRIACUS affectus. LIPOTHYMIA. PHTHISIS.*

RECURRENS. vide *PLEURITIS. PERIPNEUMONIA.*

SERRATILIS. v. *PLEURITIS.*

SPINAE *Pulsatio*, in *VARIOLIS & MORBILLIS.*

SYNCOPE. v. *CARDIALGIA. CHOLERA. HYSTERICA passio. SYSTOLE velocior Diastole, in FEBRIBUS putridis continuis.*

TARDUS. v. *FEBRIS Quotidiana continua, Quartana continua, Quotidia-*

diana & Quartana intermittens.
FUROR *uterinus.* **HYPOCHON-**
DRIACUS *affectus.* **PARALT-**
SIS.

TEMPORUM *Pulsationes in* **VARIO-**
LIS & MORBILLIS.

TENSIONE *quadam praepeditus. v.*
ANGINA. ASCITES. HY-
DROPS.

TREMOR *Cordis. v.* **EPHIALTES.**
PARALYSIS.

VERMICULARIS *in* **PERIPNEU-**
MONIA.

VARIUS. v. CHLOROSIS. FUROR
uterinus. SCORBUTUS.


VALIDUS. v. SYNOCHUS *simplex.*
FEBRIS *Quartana continua.*

VEHEMENS. v. FEBRIS *Synochus.*
MANIA. MORBILLI & VA-
RIOLAE.

UNDOSUS. v. ANGINA. FE-
BRIS. PHRENITIS. PERI-
PNEUMONIA.

Hae generales proprietates, tactu
 observabiles, diagnosi & prognosi,
 B 2 pra-

praxi dicatum Medicum, imbuere poterunt. Brevitati consulens, parte hac secunda, nomina tantum dedi, utpote in prima parte jam applicata. Habet unusquisque, quibus ante dicta augeat.



C A P U T II.

D E

U R I N I S.



P A R S I.

U R O S C O P I U M particulare.

In quo URINAE, earumque conditiones variae, pro singulis morbis, in specie describuntur.

A NASARCA. URINAE tenues atque albae; paucae in genere vero.

APE-

APEPSIA. *URINAE* tenues, aquosae & decolores; interdum tamen crassae & rubrae apparent.

APOPLEXIA. *URINA* utplurimum est crassa, modica palearis, ac veluti aeruginosa, hypostasin habens farinae similem.

ARTHRITIS. *URINA* tenuis, flava, subrubra, crassa & perturbata; pituitae, tenuis & aquosa, *Melancholiae* causam imputat. Ad parietes urinalis, reperiuntur plerumque arenulae ruberrimae. Quibus *abscessus* ad articulos timetur, hos liberat *URINA* multa crassa & alba reddita. Si multa *URINA* reddatur, bonum est signum.

ASCITES. *URINAE* paucae, crassae, interdum rubrae. Sic, utplurimum rubra, cum crasso sedimento. Praeter dicta etiam subinde varia. *URINA* ex vini potatione, & ex non potis medicamentis, si mutatur, reliquis coindicantibus, bonum est.

ASTHMA. *URINA* modo flammea modo pallida, plerumque arenulis

rubicundis, matulae latera occupantibus, referta.

ATROPHIA. *URINA* oleaginosa matulae notae.

CACHEXIA. *URINAE* saepius sunt crudae, aquaeae, subinde turbidae, copioso sedimento albo.

CATARRHUS. *URINA* crudior.

CHLOROSIS. *EXCRETA* a quacunque via facta, cruda sunt & pituitosa.

CHOLERA. *URINA* vix ulla redditur. *URINA* livida vel nigra, cum pulsu intermittente? Mors in propinquo. *URINAE* ardor vel stranguria succedens bonum.

COLICA. *URINA* aliquando crudior magisque alba, interdum etiam flavac rubicunda &c. *URINAE* parca excretio, cum ardore.

CORYZA. *URINA* crudior (forte in vehementiori.)

DIABETES. *URINA* quandoque instar mellis dulcescens & albescens.

DYSURIA. *URINA* tenuis intense tincta, interdum flammea, vel admix-

mixtam habens biliosam & pituitosam purulentam materiam.

EPILEPSIA. *URINAE* in quibusdam tenues & crudae. Aliquando, excretionem pituitosi humoris, per *URINAM* solvitur.

FEBRIS in *genere*. *URINAE* in principio crudae, tenues, in progressu & statu morbi turbantur, in declinatione deinde naturaliter clarescunt, cum sedimento copioso.

FEBRIS ARDENS vel **BILIOSA**, *Causus*. *URINA* acris flammea, initio semper cruda, sine sedimento.

FEBRIS CONTINUA in *genere*. *URINAE*, quamdiu in *Febribus*, praesertim continuis, sunt crudae, tamdiu res aegri in statu consistet ambiguo; quando vero adsunt signa Coctionis & Criseos, semper quaelibet fausta ominari possumus: contra, quae coctae jam plus minus apparebant, si recrudescent denuo, semper periculum portendunt.

FEBRIS CONTINUA ACUTA. *URINA* autem admodum cruda, in

Febribus ardentibus, valde periculosa est, & plerumque Mortem annuntiat. *URINA* alba tenuis & clara, in delirantibus, cum *Febre* continua, vel ardente, lethale signum. Quanto rubicundior est initio, tanto citius terminatur morbus, cum signis bonis, benignius, cum malis vero, eo peior exitus.

FEBRIS CONTINUA LENTA PRIMARIA. *URINAE* crassae intensius tinctae, quae facile turbantur, & subinde multum sedementi seponunt.

FEBRIS CATARRHALIS. *URINAE* intensius tinctae, sed uno alterove die elapso crassescere, hinc turbari, & copiosum sedimentum deponere solent.

FEBRIS ELODES. *URINAE* fere naturales, vel quaedam *URINIS* innatant, instar telae aranearum, quando colliquatio pinguedinis. Vel si cum *URINA*, corpuscula ervi vel hordei speciem referentia, prodeant, quae carnis quasi colliquationem indicant;

dicant; vel denique *URINAE* multitudo, per plures dies excreta, quando sanguis & humores colliquantur.

FEBRIS HECTICA. *URINA* primo naturali similis est, tum colore, tum sedimento. in progressu oleosa supernatant, & sedimenta sunt farinacea. Sic, *URINAE* in principio sanorum sunt similes; sin vero concurrat vitium stomachi, *URINA* alba, pallida & tenuis subinde excernitur. *Hectica* ad *Marasium* progrediente, *URINA* est oleaginosa.

FEBRIS MALIGNA. *URINA* varia, ejusque consideratio curae cordique maximopere esse debet; inde Diagnofis, Prognofis & Cura. *URINAE* faepe sanorum sunt similes, adeo ut in maligniffimis *Febribus*, *URINA* optime constituta interdum excernatur: unde tales *URINAE*, praesentibus aliis pravis signis, certum malignitatis signum praebent. Interdum in statu turbidae fiunt, sed tenues sunt; indeque

vel paucum vel nullum sedimentum deponunt; simul etiam color talium dilutior est, quod tamen nil boni denotat. Unde *malignis* in *Febribus*, Coctionis & Cruditatis ratio non habetur tanta, quanta in benignis: interim tamen, etiamsi pessime habuerint aegri, modo etiam, in summa virium prostratione, *URINAE* excernantur crassae, ac fiant turbidae, & sedimentum plus minus copiosum, vel candidum vel lateritium simileve sed aequale deposuerint, semper bonum signum est. Contrarium obtinet, melioribus signis praesentibus, *URINA* attamen cruda & perspicua, licet crassa & intense tincta existente, atque ita perdurante, nihilominus intereunt aegri; ut etiam, in tali *URINA* clara, aliquid quasi sedimenti flavescentis, seorsim natante videatur, hoc chyli portio est, ex assumptis, cum *URINA* secreta. *URINAE* sanorum similes, vel perturbatae simul & crassae permanentes, malae. Multi, Coctionis si-

gnis

gnis in *URINA* apparentibus, sed denuo recrudescentibus, sublatis sunt e medio. *URINA* tamen cocta, laudabile habens Enaeorema, per aliquod dies continuans, & in sedimentum sensim abiens, salutem certam perpetuo pollicetur. Rarum est, quod cruda *URINA*, metastasin materiae peccantis, sive producti morborum, in morbis malignis, felici eventu insinuet. *URINA* pinguis & oleaginea, nigra aut livescens, cum hypostasi nigra aut livescente, certum exitium praenuntiat. *URINA* admodum copiosa, quam febris immutatio non sequitur, periculosa est, quia colliquationem significat.

FEBRIS INTERMITTENS. Hic *URINAE* inspectio, ut in *continuis*, tanti moliminis quidem non esset, eodem modo tamen considerata.

FEBRIS INTERMITTENS *Quartana*. *URINAE* in principio albae, tenues & crudae, in progressu vero, coloratiores & crassiores apparent. Cum Coctionis signis, etiam *URINA*
nigra

nigra bona est. Interdum motu Critico, crassa solvitur *URINA*.

QUOTIDIANA. *URINAE* in principio albae, tenues & crudae, in progressu vero, coloratiores apparent. *URINA* non semper alba & tenuis est, sed potius insigniter rubra.

TERTIANA. *URINA* aliquando flava est, rufa vel rubra. Sic rufa atque turbida. Nebula alba in *URINA* ceu Coctionis nota, brevi solvendam *Febrim* arguit, hac vero absente longiorem fore.

**SEMITERTIANA s. HEMITRI-
TAEUS.** *URINAE* crudae, tenues & decolores, interdum turbidae sunt, cum nullo aut malo sedimento.

SYNOCHUS SIMPLEX. *URINA* crassa, colore a naturali parum recedens, sed paulo rubicundior. in *Ephemera*, plus minusve rubicunda & a naturali colore atque consistencia, magis vel minus recedens, brevitatem aut longitudinem morbi annuat.

SYNOCHUS PUTRIDA. *URINAE*

in

initio crudae aut parum coctae, rubrae etiam & crassae. Si Coctionis signa evidentia appareant die quarto, & nullus comitatur error, salutariter die septimo terminabitur: si vero tardius signa Coctionis appareant, ad undecimum, vel decimum quartum diem, extendi potest. Si vero Coctionis signa nulla prorsus appareant, aegrique tornatilem faciem, seu instar sphaerae turgidam habeant, morbi longitudinem ostendit. *URINA*, quanto rubicundior ab initio, caeteris paribus, tanto securior & citior solutio morbi significatur, si nempe in ea cita Coctionis signa appareant: at cum signis Cruditatis si haec? Mortis periculum minatur, praecipue si vires sint debiles. *URINA* alba pessima, Mortem utplurimum portendit.

FEBRIS QUARTANA *continua*. *URINA* in principio tenuis, postea varia. **QUOTIDIANA** *continua*. *URINAE* initio albae, aquosae & conturbatae, post nonnihil rubrae & crassae.

TER-

TERTIANA *Continua*. Praeter exacerbationes, haec *URINAM* similem fere habet, cum *Febre Biliosa* vel *Ardente*.

FLUOR UTERINUS. *URINAE* crassae & turbidae. In *URINA*, principio albidior & crassior, ordinario sedimentum pituitosum & inodorum, vel nescio, qui flosculi pituitosi & albi perspiciuntur.

GONORRHOEA VIRULENTA. *URINAE* ardor adest, vel albicantior, & quaedam filamenta, hinc inde dispersa, apparent.

HYDROPS vide *ASCITES*. *URINAE* paucitas, in *Hydropicis* mala; & quo minus, eo deterius. Rubicundus & rubineus *URINAE* color, desperatam rem indicat. in sicco *Hydrope*, stillicidium *URINAE*, malum signum.

HYPOCHONDRIACA AFFECTIO. *URINA*, pro re nata, in hoc affectu varia est; nunc tenuis, nunc crassa; rubra & turbida satis familiaris, cum arenulis rubris, quae nihil

nihil aliud videntur esse, quam fa-
lia. Maxime proprium & quasi Pa-
thognomicum signum est, quod ae-
gri subinde *URINAM* reddant plane
limpidam, ad instar aquae fontanae,
magna copia & impetu diu conti-
nuato. Varia igitur *Hypochondria-*
corum est *URINA*, imprimis extra
paroxysmum, similis sanorum, dum
vero paroxysmus gravior urget, so-
let esse pallida plus minus aquea. Si
a remediis turbida fiat, signum est
medicamenta rite operari.

CTERUS. *URINAE* sunt colore
flavo, intense saturato, tinctae, ad
rubrum vergente, quae linteum im-
mersum, colore flavo imbuunt. Si
Icterus Criticus, *URINAE* bene co-
loratae. Ut plurimum *URINA* est cras-
sa & turbida; immo, pauca intense
tincta ex flavo & rubro nigricans.
URINA imprimis *Icterum* manife-
stat, non quod lutea appareat, sed po-
tius passea, id est crasse tincta, ru-
tilante colore, tingens linteum im-
mersum non solum flavo, sed con-
stante

stante flavissimo colore: quod si subfederint? Sedimentum quasi argilla-ceum seponunt. Interdum ex viridinigricantes, interdum ex flavo & rubro nigricantes observantur *URINAE*.

ILIACA Passio. adest quandoque mingendi quaedam difficultas.

ISCHIAS. vide **ARTHRITIS**.

LETHARGUS. *URINA* est jumentorum *URINIS* ut plurimum similis, quod semper melius est, quam si esset clara. Sic, saepe turbida admodum.

LUES VENEREA. *URINAE* ardor, quasi *Stranguria*. Est albicantior *URINA* solito, & cum filamentis hinc inde, uti in *Gonorrhoea*, dispersis.

LUMBRICI. *URINA* recenter excreta, instar lactis, saepe albicans.

MENSTRUUM ALBA, vide **FLUOR UTERINUS**.

MORBILLI vide **VARIOLAE**.

NEPHRITIS. *URINA* aliquando cruenta; ad paroxysmi initium *URINA* tenuis aquosa & pauca, urgente dolore

dolore quandoque supprimitur : Post paroxysmum , *URINAE* crassae , turbidae , copiosae , cum arenoso sedimento , atque arenulis & saburra &c. Sic saepe cruenta tenuis , aquosa & pauca , circa initium paroxysmi Nephritici ; nunc arenulae , lapilli , sabulosaque *URINA* , nunc suppressio ejus , calculum in vesica , *URINA* albida instar lactis & turbida saepe denotat. Item mucus albus & levis , mediam *URINAE* partem subinde replens , praeter antedicta.

PARALYSIS. *URINA* ut plurimum est alba & tenuis.

PHRENITIS. *URINA* primum crassa , mox tenuis & diaphana , *URINAE* albae & pellucidae *lethales*. *URINA* solet esse flammea & tenuis saepe ; alba , majoris perniciiei nota. *URINAE* cruentae , albae & pallidae , pessimae sunt. Quandoque supprimitur *URINA*.

PHTHISIS ; *URINAE* aliquando innatat pingue.

PLEURITIS. *URINA* rubra & crassa ,

fa, cum corona interdum livefcen-
te, indicat caufam in fanguine: *U-*
RINA tenuis & flava, bili caufam im-
putat; pallida & craffa, pituitae: ru-
bra obfcura, *Melancholicae* mate-
riae. *Urinarum* veruntamen minor,
quam faepe *fputorum*, eft habenda
ratio.

PLEUROPNEUMONIA. Praeter an-
tedicta fere, *URINAE* circa initium
craffae, fi postmodum, ante quar-
tum diem, tenues factae, pelli-
mum.

PODAGRA. vide *Arthritis*.

RHEUMATISMUS. *URINAE* craf-
fae & multae, in declinatione pro-
deuntes, morbi folutionem affe-
runt.

SCORBUTUS. *URINAE* variae funt:
interdum clarae & etiam rubrae, in-
ftar lixivii; interdum admodum craf-
fae, fedimentum rubrum ac craffum,
plus minusve copiofum, inftar fari-
nae laterum, habentes; quandoque
acres. Hodie turbidae ac craffae,
cras tenues & aquosae; jam palli-
dae,

dae, mox citrinae, aureae, rubrae. Sic, *URINA* saepe tenuis, pallida aut vinosa, aut citrina, sed cum arenulis, partim vitro adhaerentibus, partim superficiei innatantibus, partim per substantiam liquoris diffusis. In *URINA* saepe volatile supernatat, ut interdum etiam sublimetur. Adeoque *URINA scorbuticorum* admodum varia est, ut plurimum flammæ, hae subinde mutantur & fiunt naturaliter tinctae, cum copiosis arenulis rubris friabilibus, inde ad vasis latera secedentibus. In *URINA* aliquando pinguedo, instar pelliculae, supernatat. Hic morbus, Patriae nostrae, heu nimium, flebile flagellum!

STRANGURIA. *URINAE* stillicidium cum difficultate & dolore; turbidae saepe.

VARIOLAE & Morbilli. *URINA* sanguinea lethalissimum signum. *URINAE* nigrae aut lividae, magnum ostendunt periculum. *URINA* rubicunda & tenuis, interdum subtur-

bida est ; fanorum etiam nonnunquam similis. Interdum *Diabetes*, immo *miſtus cruentus*, aegros fatigant. Alba cum ſedimento furfuraceo, etiam apparere in hoc morbo ſolet. *URINA* fanorum non diſſimilis, interdum tamen turbida eſt, quod contentorum agitationem indicat.

Plurima adhucdum, ad haec addi poſſe de *URINIS* praedicata, non abnuo haec vero ſcopo noſtro ſufficere, nullus dubito. Anomala atque ſaepiſſime heterodoxa apparentia, unusquisque, pro virili expugnare & inveſtigare debet. Certa veruntamen dubiis ſemper anteponenda ; immo quando res urget, ſuſpicata falſis. Quanti neceſſitudinis ſit *URINAE* inſpectio, in Morborum differentiis & intenſionibus, diſtinguendis, neminem latet, ſi modo a limine ſalutaverit Medicinam. Vires aegri, corporis, vaſorum ac ſanguinis indiſpropalantur, atque quomodo medicandum apertiffime fere indicatur.

P A R A

P A R S II.

U R O S C O P I U M
Universale,

Quod, ex URINIS, morbos, earumque causas varias indicat.

U R I N A.

ACRIS, *aquosa & pauca*, ingruente paroxismo *nephritico*.

ACRIS & *flammea*, initio semper cruda, sine sedimento, in *Febre ardente*.

ACRE quandoque sedimentum & rubrum, cum *URINIS* claris & rubris, in *Scorbuto*.

AERUGINOSA. vide 53.

ALBA & *aquosa*, atque *conturbata*, initio *quotidianae* continuæ.

6. **ALBA**, *crassa*, *multa* liberat, ab-
fcessu imminente ad articulos, de-
ponendo in *Arthritide*.
7. **ALBA**, *cruda* & *tenuis*, initio
quartanae & *quotidianae*.
8. **ALBA** vel *cruda* admodum, in
Febris ardentibus, valde pe-
riculosa, & plerumque Mortem
portendit.
9. **ALBIDIOR** & *crudior* aliquando,
in Colica.
10. **ALBIDIOR** & *crudior* ordinario,
cum flosculis albis pituitosis, in
Fluore uterino.
11. **ALBA**, *clara* & *tenuis*, in *deli-*
rantibus, cum *Febre continua*
vel *ardente*, lethale signum.
12. **ALBESCENS** & *dulcescens* in-
star mellis, in *Diabete* colliqua-
tiva.
13. **ALBICANS** instar lactis, recen-
ter excreta, *Lumbricorum* ali-
quando signum est.
14. **ALBICANTIOR** aliquando, cum
quibusdam filamentis hinc inde
dispersis, & **URINAE** ardore, in

Gonorrhoea virulenta , & Lue Venerea.

5. ALBIDA instar lactis & turbida, saepe *calculum* in vesica denotat.
6. ALBA *pallida* & *tenuis* , si concurrat vitium *stomachi*.
7. ALBA & *pellucida* in *Phrenitide*, lethalis.
8. ALBA in *Phrenitide*, majoris perniciiei nota.
9. ALBA in *Syncho putrida*, pessima , Mortemque utplurimum portendit.
10. ALBA cum sedimento *furfuraceo*, aliquando in *Variolis* apparere solet.
1. ALBA & *tenuis*, in *Anasarca*.
2. ALBA & *tenuis* nonnunquam, in *Febre quotidiana*.
3. ALBA & *tenuis* , in *Paralysi*.
4. AQUOSA *cruda* saepius in *Cachexia* , subinde turbida , cum copioso sedimento albo.
5. AQUOSA & *limpida* , plane instar aquae fontanae , magna copia & impetu diu continuato,

in *hypochondriacis* subinde red-
ditur.

26. **AQUEA** plus minus & pallida
esse solet, in *hypochondriacis*,
dum gravior urget paroxysmus.
27. **AQUEA** tenuis in *Arthritide*,
causam *melancholicæ* materiae
tribuit.
28. **AQUOSAE** tenues & decolores
URINAE in *Apepsia*.
29. **AQUOSA** tenuis & pauca, ad
initium paroxysmi *Nephritici*.
30. **AQUOSAE** tenues, subinde in
Scorbuto, caeteroquin inconstan-
tes & variae.
31. **AQUOSAE**, *albae* & *conturba-
tae*, postea nonnihil *rubrae* &
crassae, in *quotidiana continua*.
32. **ARANEARUM** *tela* ad instar
quaedam, *URINIS* aliquan-
do innatant, in *Febre Elodes*,
quando fit colliquatio pinguedi-
nis.
33. **ARDOR URINAE** vel *Stranguria*
sucedens, in *Cholera*, bonum
est signum.

34. **AR-**

34. **ARDOR URINAE**, ejusque parca excretio, in *Colica* passione.
35. **ARDOR URINAE**, in *Gonorrhoea virulenta*.
36. **ARDOR URINAE** in *Dysuria* vel *Stranguria*.
37. **ARENULAE** & *arenosum sedimentum*, cum *URINA* crassa & turbida frequens, in *Nephritide*.
38. **ARENULAE** ruberrimae, ad parietes urinalis, ut plurimum in *Arthriticis* reperiuntur.
39. **ARENULIS** *rubicundis*, latera matulae occupantibus plerumque, referta *URINA*, in *Asthmate scorbutico*; caeterum, modo flammea, modo pallida.
40. **ARENULAE** rubrae sive falia, cum *URINA* turbida & rubra, alias etiam varia, in *hypochondriacis*
41. **ARENULAE** rubrae friabiles, cum *URINA* flammea, hinc naturaliter tineta, in *Urinis scorbuticorum*.
42. **AUREA** aliquando in *Scorbuto*, caeterum varia.

- CLARA *alba*, vide II.
43. CLARA URINA peior, quam turbida, & jumentorum similis, quae in *Lethargo*.
44. CLARESCUNT URINAE, cum sedimento copioso, in declinatione *Februm*.
45. COCTIONIS in *Febribus* signum est, quando URINAE, quae antea fuerant clarae absque sedimentis, nunc crassiores, & magis contentis saturatae, atque sponte turbidae prodeunt, unde Coctionis initium; quod si porro turbidae, clarescere, & ad fundum contenta demittere incipiant, signum est progressus ulterioris Coctionis, in URINA.
46. CLARAE & rubrae instar lixivii quandoque, URINAE scorbuticorum.
47. COCTIONIS nota, nebula alba in URINA tertianae, brevi solvendam *Febrim* arguit: & contra hac absente, longiorem denotat.
48. COCTIONIS signa evidentia, die quar-

quarto si appareant, in *Synocha putrida*, & nullus committatur error, salutariter die septimo terminabitur: si vero &c. vide in *Febre, Synochus putrida*.

49. COCTIONIS etiam in *Synocha putrida*, si modo appareant, quanto etiam rubicundior ab initio fuerit *URINA*, caeteris paribus, tanto securior, & cito morbum solvendum indicat.
50. COCTIONIS *signis* praesentibus, in *quartana*, etiam *URINAE* nigrae bonae.
51. COCTIONIS *signis* manifeste in *URINIS* apparentibus, iisque denuo recrudescentibus, malum, & multi perduntur hac de re, in *Febribus malignis*.
52. COCTIONIS *signis* praesentibus, die 9. aut 10., *Petechiae* apparentes, cum virtutis robore, adeo malae non semper sunt, sed saepe Vitae praecones.
53. COCTIONIS *signis* praesentibus & perseverantibus, in *Febre continua*,

nua, semper fere boni ominis sunt.

54. COCTIONIS & *Cruditatis* ratio aequae habenda, in *Febris* *malignis* quam in *benignis*, in his veruntamen adhuc magis.

55. COCTAE URINAE plus minus apparentes, si denuo recrudescent, periculum adest. Verum enim vero, signa Coctionis praesentia, semper meliora nullis.

56. COLORATIORES & *crassiores* apparent URINAE, in progressu *quartanae*, & *quotidianae intermittentis*.

57. CITRINAE, *aureae*, *rubrae* nunc, alias *pallidae URINAE scorbuticorum*.

58. CONCOCTAE URINAE & laudabile *Enaeorema* habentes, idque pluribus diebus perseverando, & in diem magis se uniens, ac in matulae fundum sensim descendens, salutem perpetuo pollicetur, etiam in *malignis*.

59. COPIOSA admodum URINA, quam

quam *Febris* imminutio non sequitur, periculosa, in *malignis*.

60. COPIOSAE & *crassae URINAE*, in declinatione *Rheumatismi* prodeuntes, solutionem morbi adferunt.
61. COPIOSAE & *limpidae*, in affectu *hypochondriaco* subinde.
62. COPIOSAE, *turbidae*, *crassae URINAE*, cum arenoso sedimento, arenulisque, post paroxysmum *nephriticum*.
63. CRASSA utplurimum modica palearis, ac veluti aeruginosa, hypostasim farinae similem habens in *Apoplexia*.
64. CRASSAE, perturbatae *URINAE*, in *Arthritide*, a pituita.
65. CRASSAE, *paucae* & interdum *rubrae*, in *Ascite*.
66. CRASSAE & *rubrae* interdum apparent *URINAE*, in *Apepsia*.
67. CRASSA colore, a naturali parum recedente, sed paulo rubicundiore, in *Synocha simplici*.
68. CRASSA & *rubrae* nonnunquam
URI,

URINAE in *Syncho putrida*.

69. CRASSAE vero, intensius tinctae, quae facile turbantur, & subinde multum crassamenti seponunt, in *continuis lentis*.

70. CRASSAE *URINAE*, si fiant turbidae, & sedimentum plus minus copiosum vel candidum, lateritium simileve, sed aequale deposuerint, etiamsi de caetero pessime habuerint aegri, semper tamen bonum signum, in *Febribus malignis*.

71. CRASSAE & *rubrae* nonnihil, vide 31.

72. CRASSA licet & intense tincta, cruda tamen & perspicua existente, ac ita perdurante *URINA*, in *Febribus* malignis, aliis signis, melioribus licet praesentibus, nihilominus intereunt aegri.

73. CRASSAE & *perturbatae* manentes *URINAE*, nec recedentes, in malignis *Febribus*, malae.

74. CRASSAE & *turbidae URINAE*, in *Fluore uterino*.

75. CRASSA, nunc tenuis & varia, in *affectu hypochondriaco*.
76. CRASSA & *turbida*, immo pauca, intensa flavedine tincta, in *Ictero*.
77. CRASSA primum, mox tenuis & diaphana in *Pbrenitide*.
78. CRASSA & *rubra*, cum *corona* interdum livescente, indicat causam *Pleuritidis*, similiter *Peripneumoniae*, in massa sanguinea existentem.
79. CRASSAE URINAE, sub initio *Peripneumoniae*, postmodum vero, ante quartum diem tenues factae, lethale signum.
80. CRASSAE & multae, in declinatione morbi prodeuntes, ejus solutionem indicant, in *Rheumatismo*; Crisis etenim facta, & secreta materia peccans est.
81. CRASSAE admodum aliquando URINAE, cum sedimento rubro ac crasso instar farinae laterum, in *Scorbuto*.
82. CRASSAE inconstantes jam & tur-

turbidae tenues aquosae, sequenti die, in *Scorbuto*.

83. CRASCESCERE, hinc turbari, & copiosum sedimentum deponere solent, postquam uno alterove die prius intensius tinctae fuissent *URINAE*, in *Febre catarrhali*.

84. CRASSIOR etiam subinde & de caetero varia, in *malignis* saepe, sine certo verumtamen *Judicio*, *URINA* est.

85. CRASSIS *URINIS* interdum, motu critico solvitur *quartana*.

86. CRUDA aliquando *URINA*, quamvis raro metastasin materiae morbigicae, in morbis malignis, felici eventu insinuat.

87. CRUDAE & tenues *URINAE*, in nonnullis *Epileptics*.

88. CRUDAE & tenues saepissime, in *Februm* initio.

89. CRUDAE in *Febris* continuis, quamdiu fuerint *URINAE*, in ambiguo fluctuat aeger.

90. CRUDAE aut parum coctae *URINAE* initio rubrae & crassae etiam

- etiam, in *Syncho putrida*.
91. CRUDAE, decolores & tenues atque turbidae interdum *URINAE*, cum malo & saepe multo sedimento, in *Hemitritaeo*.
92. CRUDIOR *URINA*, in *Coryza*.
(forte vehementiori.)
93. CRUDITATIS est signum, *URINA* clara absque sedimentis excreta.
94. CRUDITATIS signis existentibus, in *URINA* rubicundiori, ab initio, in *Syncho putrida*, periculosum.
95. CRUDITATIS & Coctionis ratio, magis saepe habenda est (& haberi potest) in *benignis Febris*, quam in *malignis*.
96. CRUENTA aliquando, circa initium paroxysmi *Nephritici*, est *URINA*, atque postea excernitur.
97. CRUENTAE in *Phrenitide URINAE*, pessimae sunt, & funestus saepius morbi exitus.
98. DIABETES seu *URINAE* profluvium, in *Morbillis & Variolis*,
D

lis, aliquando dire aegros fatigat.

99. DULCESCENS instar mellis & albescens quandoque, *URINA Diabeticorum*.
100. ERVI vel *hordei* speciem referentia corpuscula, cum *URINA* prodeuntia, in *Febre Elode*, carnis significant colliquationem.
101. DIFFICULTAS & dolor cum *URINAE* stillicidio, in *Stranguria*.
ENAEOREMA. vide *Sedimentum* 159.
102. FLAMMEA interdum & tenuis, aut intense tincta, vel admixtam habens biliosam & pituitosam purulentam materiam, in *Dysuria*.
103. FLAMMEA solet esse & tenuis, saepeque alba, majoris pernicipis nota, in *Phrenitide*.
104. FLAMMEA utplurimum est *URINA Scorbuticorum*.
105. FLAVA est aliquando, rufa vel
ru-

rubra , in *Tertiana intermittente*.

106. FLAVO colore intense saturato , ad rubrum vergente , infecto , quo immersum linteum colore imbuitur flavo , *Ictericorum URINA* est.

107. FLAVO ex rubro , sive ex viridi , nigricant fere *Ictericorum URINAE*.

108. FLAVA , tenuis , subrubra , in *Arthritide* saepius.

HORDEI species. vide 100.

HYPOSTASIS. vide *Sedimentum*.

109. JUMENTORUM *URINAE* similis , utplurimum in *Lethargo* ; hoc melius quam si clara esset.

110. LACTESCENS aliquando in pueris , *Lumbricis* laborantibus.

111. LAPILLI cum *URINA* excernuntur saepe , in *Nephriticis*.

112. LIMPIDA ad instar aquae fontanae , Crystallinae , magna copia & impetu , diu continuato red-

ditur aliquando *URINA*, in affectu *Hypochondriaco*, cujus signum Pathognosticum fere est.

113. *LIVESCENS corona*, cum *URINA* rubra & crassa, *Pleuritidis* causam, in sanguine quaerendam, denotat.
114. *LIVESCENS* nigra aut pinguis *URINA*, cum hypostasi nigra aut livescente, certum, in *Febre maligna*, praenuntiat exitum.
115. *LIVIDA* vel nigra *URINA*, cum *PULSU intermittente*, in cholera, Mors in vicinia est.
116. *LIVIDAE URINAE* aut nigrae, funestum exitum metuendum annuntiant, vel maximum periculum, in *Variolis & Morbillis*.
117. *LUTEA* immo potius *Passsea*, *URINA Ictericorum*.
118. *MICTUS cruentus* aliquando, in *Variolis & Morbillis*, ut & in *Nephritide*.
119. *MINGENDI* difficultas, in *Iliaca passione*.

120. MINGENDI in *Nephritide* saepe impedimentum.
121. MUCUS *albus & levis*, mediam partem *URINAE* replens, in *Nephritide*.
122. MUTATIO *URINAE*, ex potatione imprimis vini, magis quam medicamentis facta, reliquis coindicantibus, bonum in *Hydrope*.
123. NIGRA. vide 50. 107. 114. 115. 116.
124. OLEAGINOSA, in *Asthmate*, malum.
125. OLEAGINOSA *URINA*, *Hectica* progrediente ad *Marasmodum*.
126. PAUCA in *Hydrope*, malum.
127. PITUITOSI humoris per *URINAM*, excretionem hac, saepe solvitur *Epilepsia*.
128. PALLIDA atque *tenuis & vinosa*, aut etiam citrina, cum arenulis vitro adhaerentibus, in *Scorbuto* saepe.
129. PINGUEDO instar pelliculae, fu-

pernatat saepius *URINAE Scorbuticorum.*

130. PINGUES vero, *URINAE Phthysicorum.*

131. PITUITOSA & cruda *URINA* in *Chlorosi.* vide Num. 10. 26.

132. RUBICUNDUS & *Rubineus* color *URINAE*, in *Ascite*, indicat rem desperatam.

133. RUBICUNDA ac *flava*, in *Colica* interdum &c.

134. RUBICUNDIOR, quam naturalis, in *Synocha simplici.*

135. RUBICUNDA plus minus, & a naturali colore & consistentia magis vel minus recedens *URINA*, brevitatem vel longitudinem morbi portendit, in *Febre Ephemera.*

136. RUBICUNDA & tenuis interdum subturbida, in *Variolis* atque *Morbillis.*

137. RUBRAE interdum crassae nonnihil & paucae, in *Ascite*: saepius crassissimae etiam.

138. RUBRA insigniter saepe, in *Quotidiana*.
139. RUBRAE & aliquantulum crassae in progressu *Quotidianae continuæ*.
140. RUBRA & turbida, cum arenulis rubris, fatis familiaris *Hypochondriacis*.
141. RUBRA & obscura *URINA*, in *Pleuritide*, causam a *Melancholia* videtur ducere.
142. RUBRAE etiam & clarae instar lixivii, caeterum variae *URINAE Scorbutorum*.
143. RUBRO ex flavo fere nigricantes, *Ictericorum*.
144. RUFA & turbida *URINA*, in *Tertiana*.
145. RUTILANTE colore intense tincta, passaeque, *Ictericorum URINA*.
146. Sub RUBRA quandoque, in *Nephriticis* atque *Arthriticis*, porro vide Num. 38. 39. 66. 105.
147. SABULOSA *URINA* etiam, in *Nephriticis*.

148. SANGUINEA URINA, lethale signum, in *Variolis & Morbillis*.
149. SANORUM. *Quantitate*, debet esse minor assumptis. *Colore*, citrino; ea quae post coctionem excernitur. *Contenta*, praeter hypostasim, nulla: bona hypostasis esse debet coloris albidii: figurae rotundae, & aequalis, versus fundum subsidens. *Consistentia*, similis cerevisiae clarissimae: vel media inter oleum & aquam, ut aliis. *Nubeculae & Enaeorematis* praesentia, in sanis saltem, cruditis chylosae, vitio digestionis primae coacervatae, signum est.
150. SEDIMENTUM album copiosum, cum URINA subinde turbida in *Cachexia*.
151. SEDIMENTUM argillaceum, quasi URINAE Ictericorum, luteae subsidentes deponunt.
152. SEDIMENTUM crassum cum URINA rubra in *Ascite*.

153. SEDIMENTUM subinde, ex turbidis crassis, atque intensius tinctis, seponitur, in *Febre continua lenta*.
154. SEDIMENTUM copiosum, ex turbida *URINA* deponi solet, postquam uno alterove die praevis intensius tincta fuit, in *Febre Catarrhali*.
155. SEDIMENTUM plus minusve copiosum, candidum vel lateritium, simileve sed aequale, si deposuerit *URINA*, prius crassa hinc turbida, in *Febre maligna*; quamquam aegri valde male se habuerint, semper bonum signum est.
156. SEDIMENTUM flavescens seorsim, in *URINA* cruda licet, atque clara aut crassa vel intense tincta, natans; melius quamquam aegri videantur se habere, Mortem attamen minatur.
157. SEDIMENTUM sensim deponens *URINA*, cum laudabili praevis Enaeoremate, in *URINA*

cruda, & ita per aliquod dies continuans, salutem certam in *Febre maligna* pollicetur.

158. SEDIMENTA farinacea, cum oleosa *URINAE* superficie, in progressu *Hæcticæ*.
159. SEDIMENTUM nullum aut malum, cum *URINA* interdum turbida, in *Hemitritæo*.
160. SPUTORUM major habenda ratio ut plurimum, quam *URINAE*, in *Pleuritide* & *Peripneumonia*.
161. STILLICIDIUM *URINAE*, cum difficultate & dolore, in *Stranguria*.
162. STILLICIDIUM *URINAE*, in sicco *Hydrope*, malum.
163. STANGURIA quasi, vel *URINAE* ardor, sæpe in *Lue venerea*, aut *Gonorrhoea virulenta*.
164. SUPPRESSIO *URINAE* nonnunquam in *Nephriticis*, hoc imprimis tempore paroxysmi. vide

de 1. 29. 62. 77. 109. 110. 111.
120. 128. 146. 147.

165. SUPPRESSIO *URINAE* etiam aliquando in *Phreniticis*. vide 77. 79.
166. TENUIS & *alba*, quandoque *rubra*, in *Febre Quotidiana*.
167. TENUES & *turbidae URINAE*, in statu *Februm malignarum*, cum colore dilutiore, permanentes tales, malae.
168. TENUIS & *flava*, in *Pleuritide*, bilem accusat.
169. TENUES, ante quartum diem, factae *URINAE*, dum initio *Pleuropneumoniae* crassae essent, portendunt Mortem.
170. TENUES & *aquosae*, nunc crassae & turbidae, in *Scorbuto*. vide 3. 41. 42. 46. 57. 81. 82. 104. 128. 142.
171. TINCTAE intensius *URINAE*, in principio *Februm Catarrhalium*.
172. TINCTAE intensius *URINAE*, crassae vero, aut crudae, sine sedimento, & ita permanentes, malae,

malae, in *Febris* malignis.

173. TINCTAE naturaliter saepe evadunt, quae antea fuerant flammeae URINAE, in *Scorbuto*, cum arenulis rubris friabilibus.
174. TURBIDAE, in statu *Februm*, URINAE.
175. TURBATAE, initio *Quotidianae* continuae, post nonnihil rubrae & crassae.
176. TURBATA tenuior, in *Febris* malignis, aequae mala, ut in benignis.
177. TURBATAE URINAE & crassae, cum copioso sedimento, in progressu *Februm* *Catarthali*um.
178. TURBIDA interdum, in *Variolis* & *Morbillis*, magnum contentorum motum & agitationem significat.
179. TURBIDA URINA, a remediis facta, in *hypochondriacis*, signum est medicamenta rite operari: vide 26.

80. VARIA subinde, in *Ascite URINA*.
81. VARIA, in progressu *Febris Quartanae continuae*.
82. VARIA admodum, in *Hypochondriaco affectu*.
83. VARIAE admodum, in *Scorbuto, URINAE*.
84. VIRIDIS atque nigricans quandoque in *Ictericis*.
85. VIRIUM in aegris semper habenda ratio, item *temporis & corporis, sanguinis, vasorum, consuetudinum Vitae & aliarum rerum*.
86. URINARUM saepe minor, quam *Sputorum* est habenda cura, in *Pleuritide*. vide Num. 160.

Non tribuimus huic catalogo, omnem exhaustam hic *URINAE* Diagnosin; tantum abest, ut potius minimam partem propositam agnoscamus, praecipuam tamen, atque magis, necessitudine sua, inservientem. Commemoravi, quibus carere, defectus esset incon-

conveniens in praxi: unicuique via patet, ad ulteriora, ut abundare scientia medica possit.



C A P U T I I I .

D E

U N I V E R S A L I U M U S U .



P A R S I .

M O R B I .

Quibus PURGATIO convenit.

In ALVI RETENTIONE, at leniter laxantia, quæ & umbilico exterius applicanda, ex variis succis, vel extractis *PURGANTIBUS*.

In

n ANASARCA & LEUCOPHLEG-
MATIA, ex iisdem causis, ut in
Cachexia dicetur.

n ANOREXIA, aloëtica, si causa
in primis viis, nec aeger subjectus
Haemorrhoidibus; aloë enim illud
malum exasperare solet.

n APPETITU nimio, praesertim *Fame
canina*, praemissis veruntamen,
acidum vel acre temperantibus, vel
obtudentibus.

n APOPLEXIA praeservanda, Mer-
curius dulcis cum extractis vege-
tabilibus, si *PURGATIONE*
opus, usurpari potest.

n ARTHRITIDE & *Podagra* PUR-
GATIO blanda, at temperantibus
mixta, pro ratione circumstantia-
rum, convenire potest, praefer-
tim ingruente paroxysmo.

n ASTHMA humido, tantum,
idque post sedatum paroxysmum,
ad reliquias exhauriendas, cum
gummi ammoniaco.

n AGRYPNIIS, per accidens tantum,
auferendo causam occasionalem.

In

In **CACHEXIA** *primaria*, a cruditatibus primarum viarum & sanguinis, plus minus antecedenter correctis, **PURGANTIA** conveniunt, inter quae Rhabarbarum non infimum.

In **CALCULO** *renum*, per accidens, blande laxantia, ad praecavendam aut tollendam, primarum viarum obstructionem.

In **CARDIALGIA**, per essentiam, caute tamen, & opiatis sociata.

In **CATARRHIS** (non nisi contumacioribus, & vitio stomachi, vel primarum viarum) saepe minus conveniunt, & tunc pillulae Rufi, vel similia adhibenda.

In **CEPHALALGIA** per essentiam (in qua hydragoga & cephalartica), sic maxime per consensum, in qua v. g. pillulae mastichinae conveniunt; danda itidem opera, ut alvus aperta semper servetur.

In **CHOLERA**, sed non nisi cautione, & saltem in principio acre illud abstergendum, atque blande di-

diluendum, subjunctis mox opiat-
tis.

In CHYLI *distributione laesa* (vulgo
in obstructionibus) per epicrasin,
laxantia gummatibus mixta.

In CHYLOSEOS *laesione*, detergen-
do fordes mucilaginosas, & sto-
macho adhaerentes, praesertim pi-
lulae mastichinae, aloephanginae,
& pro robustis, de hiera picra.

In COLICA HUMOROSA, in *con-
vulsiva* vero **PURGANTIA**
proprie dicta (humequantibus &
blande abstergentibus exceptis)
nocent; id vero in initio, aut
dolore sedato, sunt necessaria
PURGANTIA, & ἐκκρογονὰ
adhibenda.

In DELIRIO MELANCHOLICO,
PURGANTIA ex antimonio aut
helleboro nigro excellunt.

In DIARRHOEA, non autem in prin-
cipio statim, sufflaminato prius
humorum impetu, & deleta irri-
tationis sensu, si tunc necesse vi-
deatur, blando rhabarbarino, in-

testina abstergenda, additis etiam absorbentibus acre.

In DOLORIBUS in *genere*, convenire possunt *PURGANTIA*, prout circumstantiae requisiverint, adduntur illis evacuantibus martialia.

In DYSENTERIA parum quidem, vel etiam nihil valent laxantia, praesertim in decursu morbi, idque minus in maligna quam benigna; si itaque alvus blande laxanda sit, atque primae viae abstergendae videantur, fiat hoc in morbi initio, per rhabarbarum totum, vel serum lactis, idque commodius mane.

In EMPYEMATE si pus ad alvum vergat.

In EPILEPSIA, per consensum *PURGANTIA* necessaria, in specie mercurius dulcis: alii, tempore novi vel plenilunii, haec applicant.

In FEBRIBUS *generaliter*, saepe *PURGANTIA* nociva a quibusdam

dam censentur proprie ut crisin
impedientia, saltem blanda, primas
vias abstergentia, pro rei exigen-
tia admitti possunt; idque fere
quovis *Febris* statu, nisi Crisis
impediat; in principio ex tama-
rindis, rhabbaro, sic infuso de
fenna, salibus digestivis fociata
& acuata.

In FEBRIBUS *intermittentibus* saepe
ast non semper conveniunt, vel
in principio vel in progressu, si
potius vomitoria necessaria viden-
tur: si in primis viis excrementa
& sordes, *PURGATIO* adhiberi
potest, ex antimonio cum rha-
barbaro pauco, sale polychresto
& quodam absorbente, hocque
die antecedente intercalari, vel ali-
quot horis ante paroxysmum.

In FEBRE *hectica* blande *PURGAN-
TIA* absterfiva saltem conveniunt,
ubi prima corporis regio excre-
mentis referta est, ex cruditate
ac debilitate ventriculi.

In FEBRIBUS *malignis* cave *PUR-
GAN-*

GANTIA, & non nisi blande laxantia, primas vias abstergentia; v. g. serum lactis cum succo citri parum acidulatum, cremoreve tartari; vel decoctum tamarindorum adhibe, vel sal ipsum, ac polychrestum; haec vero declinante jam morbo & devicta pernicie, aut mox in initio morbi, vel quando alvus est laxanda.

In **GONORRHOEA** *virulenta*, **PURGATIO** mercurialis, cum helleboro nigro, jalappa, scammonio vel quodam hydragogo, omnibus praeferenda; mineralia cum mercurialibus ne jungantur, aut docte, funestus etenim posset esse exitus.

In **HYDROPE** si adhibeantur, fortiora esse possunt ex regno vegetabili vel minerali desumpta, praemissis primo lenibus & primas vias abstergentibus.

In **HYDROCEPHALO**, habita ratione virium, subjungendo roborantia cerebrum.

In

In HYDROPE *pectoris* *PURGANTIA* conducunt.

In HYDROPE *uteri*, ex elaterio, sic mercurius dulcis adhiberi posset.

In ICTERO, in principio morbi saepe nociva, nisi exigat primarum viarum obstructio, saltem lene abstersivum non nocet, in morbi progressu vero, praemissis appropriatis convenit, ex rhabarbaro, sale tartari &c.

In ILEO, considerandum vero, an deobstructio, an irritationis sublatio sit impetranda, saepe enim *PURGATIONI*, potius opiata praemittenda: *PURGANTIA* ne sint fortiora, nisi ubi jam plane pacatus fuerit furor; externe etiam umbilico illita.

In INCUBO, si ex infarctu ventriculi, a materia viscida, praemissis digestivis, helleborina, blanda etiam, & per epicrasin.

In INFLATIONIBUS in genere, si *Febris* sit juncta, blanda laxantia

proficua esse solent, alias non semper.

In INFLATIONE *ventriculi*, ructibus, aloëtica optime adhiberi possunt.

In ISCHURIA *renali*, laxantia cum tartaro vitriolato subinde fructuosa, subjungendo diuretica.

In ISCHURIA *vesicali*, ut per consensum simul vesica aliquo modo stimuletur, **PURGANTIA** blanda adhiberi possunt.

In LIENTERIA, si nil obstet, idque talia, quae praeter vim abstersivo laxativam, simul nonnihil adstringunt & ventriculum roborant; uti sunt aloëtica, rhabbarbarina, myrobolani &c.

In MANIA, si in principio **PURGANDUM**, convenit extr. hellebori nigri, cui antimonialia, **PURGANTIA** per inferiora, pro stimulo addantur.

In MELANCHOLICO *delirio*, si necesse, **PURGANTIA** ex antimonialibus aut helleboro nigro ex-

excellunt; fecus, *PURGANTIA* nimia *Melancholicis* mala saepe.

In MENSTRUORUM suppressione, praemissis digestivis, *PURGANTIA* aliquando pro ratione subiecti, convenire possunt.

In MENSTRUIS *nimiis*, saltem rhabarbarum, pro scopo potius alterativo, cum terebinthina succove plantaginis praeparata, optimum erit, quia proprie dicta *PURGANTIA* potius nocent.

In MORBILLIS & VARIOLIS, post sanatas *Variolas* semper *PURGATIO* bona, in principio vix, nisi corpus cacochymicum, primarum viarum sordities, & alvi obstructio exigat, & non nisi blandissime.

In ODONTALGIA *graviori*, ubi corpus nimis *cacochymicum*, convenit, immo & jalappa adhiberi poterit.

In OPHTHALMIA *graviore*, ex lymphâ, vel dyscrasia nimia oriunda.

In PARAPLEGIA potest utilis esse *PURGATIO*; stimulus fit colocynthis.

In PLEURITIDE, in declinatione mali saltem, alias ante diem septimum ut plurimum, & praecedente spuito, perniciofa est.

In RAUCEDINE, praesertim recenti, potest etiam, si opus videatur, *PURGATIO* institui, & hoc per Esulam, Elaterium, Jalapam &c.

In RENUM *ulcere*, praemittenda *PURGANTIA*, subjunctis mundificantibus & consolidantibus.

In RUCTIBUS vel VENTRIS INFLATIONE, aloëtica & pilulae mastichinae, vel similia usurpari possunt.

In SCORBUTO & MALO *Hypochondriaco*, *PURGANTIA* proprie dicta omnino vitanda, interim tamen, & speciatim in malo *Hypochondriaco*, alvus semper aperta servanda.

In SINGULTU, si malum in stomacho,

- cho , pilulae aloëticae cum laudano opiato mixtae , immo mercurius dulcis cum diagridio acuatus.
- In STRANGURIA *contumaciori*, pro scopo averforio *PURGANTIA* conveniunt , ex scammonio , jalappa , agarico &c.
- In SOPOROSIS *affectibus*, a colluvie recrementosa prodest, subjungendo acria & volatilia , spirituum torporem discutientia.
- In TUMORIBUS vel APOSTEMATIBUS internis , blande laxantia.
- In TUSSI *pectoralis* humida , caute tamen cum pil. cochiae , hiera picra, agarico, addito gummi ammoniaco.
- In VARIOLIS & MORBILLIS vide *Morbillis*.
- In VERTIGINE per consensum stomachi praesertim , bene conveniunt. v. g. Extractum catholicum, pilulae Rufi , de succino, de mastiche ; atque in habituali *Vertigine* , pilulae usuales & similia.
- In VISUS *debilitate* conveniunt ad con-

fortandum visum ; v. g. pilulae aloëphanginae, infusum de fennacum sale tartari , in euphrasiae & foeniculi aqua , sic extractum pan-chymagogum Crollii , pulvis hermodactylorum &c.


In VOMITU *nimio* , aloëtica imprimis , & hinc pilulae de mastiche.

In ULCERIBUS , requirente corpore cacochymico, vel humorum aversione.

In VULNERIBUS generaliter , in subjecto cacochymico , *PURGATIO* convenit mediocris.

In UTERI *Hydrope* ex elaterio & mercurio dulci , vel similia adhiberi possunt.

In **GENERE** circumstantiae & indicationes considerandae , hinc , infinitis modis , casuum , medicamentorum & formularum selectus, variari valet.



P A R S II.

M O R B I

*Quibus VOMITORIA com-
petunt.*

In ANGINA saepe, vitio ventriculi
& bilis aeruginosae &c. idque
mox in principio, ut & in mali-
gna valde, aliquando utile *VOMI-
TORIUM*, & tandem in statu ulti-
mum remedium est, pro disrum-
pendo abscessu profundius sito.

In ANASARCA & LEUCOPHLEG-
MATIA ex vitio primarum via-
rum, & hinc deficientis chyloseos,
cruditates ejus, plus minus corre-
ctae, *VOMITU* optime evacuari
possunt.

In ANOREXIA, si causa in ventriculo.

In APOPLEXIAE paroxysmo, prae-
mature & debite, in subiecto ca-
paci,

paci, administratus *VOMITUS*, optimus est, praemissa Venae Sectione.

In *ARTHRITIDE & PODAGRA*, ingruente paroxysmo, *VOMITUS* conducere potest, sed praemisso melius usu lapid. cancri, habita ratione subiecti.

In *ASTHMA*TE non tantum humido & sicco, sed etiam interdum convulsivo, in- & extra paroxysmum, pro ratione circumstantiarum, additis addendis, egregia sunt.

In *CACHEXIA primaria*, vel vitio primarum viarum, & hinc deficientis chyloseos, cruditates ejus, plus minusve correctae, evacuari possunt.

In *CALCULO renum*, extra paroxysmum quidem, ad praeservationem, & (ut quibusdam) acidi primarum viarum sublationem, *VOMITORIA* conducunt.

In *CARDIALGIA* per essentiam.

In *CATARRHIS contumacioribus*, prae-

praesertim vitio stomachi, adhiberi possunt.

CATARRHO quoque *suffocativo* (si ferre queat aeger) a causa sive interna, sive imprimis externa, subjungendo, in interna, opiata; in externa, incidentia, attenuantia.

CATOCHES seu **CATALEPSI**, antimonialia, maximi usus sunt, sic tartarus emeticus.

CEPHALALGIA per consensum, *VOMITORIA* non incongrua.

CHYLI *distributione laesa* (vulgo obstructionibus) praemissis digestivis.

CHYLOSEOS *laesione* a naturali quadam causa, circa primas vias, antimonialia usum habere possunt.

CHOLERA, RUCTIBUS, VOMITU nimio, pro re nata, si causa est in ventriculo.

DELIRIO Melancholico, *VOMITORIA* & martialia primatum
du-

ducunt, & si necesse, in dosi auctiori.

In DIABETE, in principio, *VOMITUS* pro scopo revulsionis optimus.

In DIARRHOEA, ex ventriculi causa.

In EPILEPSIA in - & extra paroxysmum, & hic in specie, ubi malum, ex consensu primarum viarum, optime convenit, & in graviore paroxysmo, utile admodum est *VOMITORIUM*.

In FEBRIBUS *continuis acutis*, aequae ac *lentis*, usum quoque habent, idque in principio aut incremento, praesertim, ubi signa *VOMITUM* indicantia adfunt, ut sunt: nausea, vomendi conatus, ructus, cardialgia, praecordiorum anxietates, tunc bona sunt mediocria.

In FEBRE *hectica*, si vitio ventriculi &c.

In FEBRIBUS *intermittentibus*, & in *quartana*, maxime, immo & quo-

quotidiana, per tartar. emeticum, vitriol. album, rad. ipecucuan. &c. aliquot horis ante paroxysmum peracta **VOMITIONE**, confortante aliquo generoso, aut aqua cinamomi & similibus, ventriculus roboratus, sic & soporifera conducent.

FEBRIUM *malignarum* principio, si a causa *epidemica* vel *contagio*, aequae ac si a privato contentorum vitio orta fuisset.

FEBRE *petechiali* & *pestilentiali*, prae aliis *malignis*, maxime proficius **VOMITUS**.

FLUORE *albo mulierum*, ex vitio ventriculi, omnino bona sunt, praemissis digestivis, aromaticis stomachicis &c.

GUSTU *depravato* v.g. *icteritio*, **VOMITUS** saepe convenit, hoc facto, serum lactis propinetur, vel simile quid.

HECTICA *Febre*, si vitio ventriculi orta.

HYDROPE si adest nifus ad vomitum,

tum, vel gravior dispnoea, atque in larga dosi, alias non operabitur.

In **HYDROPE** *uteri*, propter nisum quem exferunt.

In **ICTERO** non inconveniens, subjungendo appropriata.

In **INCUBO**, si ex infarctu ventriculi, praemissis digestivis, & subjungendo volatilia ac antiepileptica.

In **INFLATIONE** *ventriculi*, ructibusque crebrioribus, convenire possunt.

In **LEUCOPHLEGMATIA**, ex vitio primarum viarum atque ventriculi.

In **LIENTERIA**, ex ventriculo, idque lenia, si videatur.

In **MANIA VOMITORIA** fortiora, necessaria.

In **MENSIUM** *emansione*, praemissis digestivis, inservire possunt.

In **PESTE**, in principio morbi, ubi venenum haeret adhuc in primis viis, quod testatur nausea, commodissime adhibetur, mixtis alexiphar-

pharmacis: sic tumoribus jam eruptis, necessitate suadente, *VOMITIO* adhuc utenda.

n *PICA*, in non gravidis, tutius, in gravidis, cautius, idque saltem secundo sive tertio, gestationis mense, & ad *VOMENDUM* aptis, vel accommodatis.

n *PHILTRIS*, *VOMITUS* necessarius, subjungendo necessaria.

n *PTHISI*, si ex vitio stomachi, vel singulari acrimonia massae sanguineae, convenit *VOMITUS*; quin & in ulcere pulmonum confirmato, ubi urget difficilis respiratio, aut est difficilis materiae excretio, sed vires constare maxime debent.

n *PLEURITIDE*, per accidens saltem, si vitiosa excrementa, circa primas vias, sanguinem coinquantia, stabulentur, & in principio, & dein, in facto abscessu.

n *PRIAPISMO*, *VOMITORIA* prae omnibus conveniunt.

In RAUCEDINE etiam *VOMITUS* interdum necessarius, praesertim inveterata.

In RENUM *ulcere* usurpari potest, ventriculum & intestina mundando.

In RUCTIBUS, CHOLERA, VOMITU, pro re nata, si causa est in ventriculo.

In SCORBUTO & MALO *hypochondriaco*, *VOMITUS* necessarius esse potest, imprimis in doloribus abdominis.

In SINGULTU, malo immediate in ventriculo haerente, optima.

In SOPOROSIS *affectibus*, si a causa externa, aut colluvie recrementosa, vel etiam *narcesi* aliqua, *VOMITUS* prodest, subjunctis acidis atque castoreo.

In SUFFOCATIONE ex fumo carbonum, aëre cellarum, puteorum &c. larga dosi, praemissis vel mixtis spirituosus.

In SUFFOCATIONE *convulsiva* inter-

terdum, pro ratione circumstantiarum.

In STRANGURIA *contumaciori*, etiam *VOMITUS* convenit.

In TABE, vide *Phthisi*.

In SYNCOPE stomachica, aut a venenis &c.

In TUSSI *catarrhali*, pro rei exigentia, subjungendo (ut quibusdam placet) volatilia sudorifera opiatis mixta; in *stomachali humida*, decoctum ligni sudorif. optimè adhibetur.

In VENENIS *assumptis*, in ventriculo adhuc haerentibus, forte *VOMITORIUM* convenit.

In VERTIGINE per consensum, tam in, quam ante paroxysmum, *VOMITUS* optimus, subjunctis remediis stomachicis atque specificis, si ex stomacho.

In VOMITU ipso, *Ructibus*, *Cholera*, pro re nata, si causa in ventriculo haeret.

In UTERI *Hydrope*, discutit enim cor-

pus, atque conquassando multum boni speratur.

In Universum: rarius & non nisi necessitate coactus, ad citius & tutius curandum *VOMITORIA* propinare soleo. Facilitatur vero quam maxime *VOMITIO*, praecedenti vesperi, dato quocunque pulvere, glutinosum in ventriculo haerens, solvente, v. g. sal alcali, vel saponaceum quoddam, junctum pauxillo oculorum cancerorum, in ipso *VOMITU* vero, potus thee, vel cardui benedicti &c. exilis, faciliat maximopere ipsum actum.





P A R S III.

M O R B I.

*Quibus SUDORIFERA ac
DIAPHORETICA con-
ducunt.*

In ANASARCA & LEUCOPHLEG-
MATIA, decoctum lign., pro
habitu corporis emendando, ista
anastomotica.

In ANGINA *benigna*, & in *maligna*,
opiatīs mixtis.

In APOPLEXIA, declinante paroxys-
mo, *SUDORIFERA*, ex lignis,
usu aliquamdiu continuato, sunt
maxime proficua; sic in *Paraple-
gia*, *Paralysi* &c.

In APHONIA subinde *SUDOR* pro-
vocandus, immo & in contuma-
ciori malo, v.g. *paralytico*, di-

aeta *SUDORIFERA*, cum lign. decocto, instituenda.

In ARIDURA, a causis internis v.g. lymphae acidae decubitu, *SUDORIFERA* interna, externis discutientibus, juncta.

In ARTHRITIDE & PODAGRA, tam in paroxysmo, opiatis maritata, quam extra; in diaeta, *SUDORIFERA* sunt optima.

In ASCITE, praesertim, malo ex vasis lymphaticis oriundo.

In ASTHMA *convulsivo*, tam in fine, quam extra paroxysmum, non negligenda: in *humoroso* similiter locum obtinent, per decoctum guajaci, & simile, quod etiam expectorationem promovet.

In CATARRHIS, *SUDORIFERA*, eaque aromatica, vel balsamica, sunt prae caeteris necessaria; ita etiam in *Coryza*, pro conditione subjecti.

In CEPHALALGIA (per essentiam imprimis) *contumaciori*, diaeta *SUDORIFERA*, optima est, prae-

praemissis praemittendis.

In DIARRHOEA, & maxime *epidémica* vel *contagiosa*, atque a fermento acri, humores ad colliquationem disponente orta. Usus maximum tunc habent, diaiscordia illa varia.

In DOLORIBUS in *genere*, maxime quandoque proficua *SUDORIFERA*.

In DYSENTERIA, maxime *epidémica* & *maligna*, dicta diaiscordia & theriacalia, sudorem & venenum expellentia, profunt.

In EMPYEMATE, si pus ad alias vias non vergat, vel exitum habeat.

In EPILEPSIA *convulsionibus* juncta, a dyscrasia humorum, multum conducunt.

In ERYSIPELACEIS *inflammationibus*; specificum, flor. sambuci.

In FEBRIBUS *generaliter* conveniunt, eligendo attamen temperata potius, eaque vel fixa absorbentia, vel volatilia (si necesse)

macra, non oleosa; in *malignis* fociuntur alexipharmaca, in principio quidem temperativa, in incremento & statu, fortiora; acidula attamen minus periculosa.

In FEBRIBUS *catarrhalibus* item, praemissis attamen lymphae acrimoniam corrigentibus.

In FEBRIBUS *continuis*, sed Coctionis, immo Crisis signis apparentibus, nec ad alias vias determinantibus, adeoque in progressu, salina vel vegetabilia bona.

In FEBRIBUS *intermittentibus* bona sunt *SUDORIFERA*, praemissis tamen universalioribus, ast non ante Coctionis signa, vel paroxysmum quartum, praesertim in *tertiana*, dando v. g. tribus horis ante paroxysmum; eaque fixa potius atque volatilia macra; in *malignis tertianis* addendo alexipharmaca.

In FEBRIBUS *malignis*, ut Germaniae practicis placet, primatum saepe obtinent, & tanto magis quanto *Febris*

bris fuerit malignior, iis, sic dicta tinctura Bezoardica, maximi usus. Optime operantur salia illa volatilia; hinc volatilia aromatica, eaque potius in principio & incremento morbi, ac ubi mitius urget aestus, alias tutius macra adhibentur; in statu, fixiora tutius, non neglectis alexipharmacis in contagiosis. Recentissimi, blanda *SUDORIFERA*, saponacea, acidula, aperientia vegetabilia, adhibent, quae administrare ac juvare valent naturam, non vero cogere, hoc tutius.

In FEBRE *petechiali* quoque primum ducunt, speciatim in principio & incremento morbi, ubi, secundum quosdam, volatilia, in specie theriacalia, tutissime adhibentur, in progressu vero ac statu morbi, fixa. Sed generaliter dictum velim: in summo periculo, summa remedia applicanda sunt, semper vero circumspicte.

In FEBRE *lacteā*, blandus *SUDOR* con-

venit & debitus *lochiorum* stimulus.

In FLUORE *albo mulierum* bona sunt, imprimis ligna *SUDORIFERA*.

In FLUORE *gallico mulierum*, inveterato, plane conveniunt.

In FLUXO *hepatico*, seu *Diarrhoea cruenta*, ea quae in *Dysenteria* praescripta.

In GANGRAENA & *Sphacelo*, theriacalia & camphora adhibentur & alia.

In GONORRHOEA *notha benigna*, conveniunt juniperina, succinata, assafras &c.

In GUMMATIBUS *gallicis*, *SUDORIFERA* ex lignis; in graviore malo, mercurialia conducunt.

In HAEMORRHAGIA quandoque habituali, opiatis mixta, ad sanguinis massam, sero acriori privandam.

In HEPATICO *fluxu*, seu *Diarrhoea cruenta*.

In HEPATIS *inflammatione* saepe, antimonium diaphoreticum & similia, si non cohibetur contraindicantibus.

In

HYDROPE quoque interdum, magis tamen *anasarca*, quam *ascite*.

HYDROPE *pectoris* bona, praemissis purgantibus.

HYPOCHONDRIACO *malo* & *Scorbuto*, profunt *SUDORIFERA*, potissimum tamen, quando partes externae gravius laeduntur, praemisso ut plurimum vomitorio.

ICTERO, morbo declinante, profunt *SUDORIFERA*.

INCUBO habituali, praemissis evacuantibus, ad universam sanguinis massam ventilandam, *SUDORIFERA* volatilia.

INFLAMMATIONIBUS *generaliter*, ad sanguinis tenuitatem & fluxilitatem conservandam, & concitatiores circulationem reddendam, placuit plurimis, *SUDORIFERA* alcalinae praesertim naturae, tam fixa, quam volatilia, ceu universalia, adhibere: haec heterodoxa nostratibus videntur, suadendo, periculosum nimis

mis esse usum, stimulantium horum alcalinorum, in omni morbo inflammatorio, & tutius posse adhiberi ea, quae proposita sunt, in *Febribus malignis*, de acidulis saponaceis &c.

In LEUCOPHLEGMATIA & ANASARCA, decoctum lignorum, pro habitu corporis emendando.

In LOCHIIS *retentis*, blanda *SUDORIFERA*, ad promovendum & stimulandum sanguinis circulum, convenire possunt.

In LUXATIONE superveniente *inflammatione*, & maxime *tumore oedematoso*, ex influxu humorum, *SUDORIFERA* apprime conveniunt.

In MENSIIUM *fluxu* nimio, ex sanguine serosiore, *Diaphoretica* bona.

In OPHTHALMIA, ex decoct. lignorum.

In PARALYSI *privativa*, *SUDORIFERA* ex lignis per aliquod tempus propinata bona sunt, prae-

mit-

mittendo Venae sectionem, si ab aliqua sanguinis suppressione vel causa simili ortum duxerit.

In PHILTRIS, *SUDORIFERA* appropriatis mixta, vel praemissa, necessaria.

In PLEURITIDE & PERIPNEUMONIA, mire saepe opitulantur.

In PUERPERARUM *morbis acutis*, interdum blandus sudor, cum debita cautela convenit, sed attende, ne *lochiorum* fluxus sistatur.

In PESTE saepe summum remedium est *SUDORIFERUM*, aequè mineralia quam vegetabilia atque alexipharmica *SUDORIFERA* reiterata, camphora his optime addi potest, refocillatis subinde spiritibus, per *SUDOREM* nimium exhaustis, analepticiis acidis, spirituosissimis; continuando etiam *SUDOREM*, post tumorum quorumvis eruptionem; aeger vero sub *SUDORE* a somno arceri poterit.

In SCORBUTO & MALO *hypo-*
chon-

chondriaco, uti eo loco dictum.
vide *Hypochondriacum malum*.

In **SOPOROSIS affectibus**, praemis-
sis praemittendis, in fine curae,
SUDORIFERA ex lignis impri-
mis, convenire possunt.

In **TREMORE** quoque, diaeta cum
decocto lignorum optima, ubi
juniperinum laudandum.

In **TUSSI nocturna catarrhali**, prae-
misso etiam, pro rei exigentia,
vomitu, **SUDORIFERA** opiatis
mixta; & in *stomachali humida*,
decoctum lignorum **SUDORIFE-
RUM**.

In **TUMORIBUS** in genere profunt
alcalia tam volatilia quam fixa; in
Rosa, rob. sambuci; in *Lymphae*
vitiis, juniperina fassafrata.


In **VARIOLIS & MORBILLIS** ne-
cessaria sunt, inter quae fixa con-
ducere videntur, ubi primarum
viarum & vasorum urgent sym-
ptomata, & tempore ebullitionis;
volatilia vero, ubi nervorum ge-
nus magis afficitur, atque excre-
tio.

tionis tempore , atque ubi pectoris , aut pulmonum metuuntur , a *Variolis* , mala , acidula tamen tutiora.

In VULNERIBUS *generaliter* conducunt , ad corrigendam massam sanguineam, *SUDORIFERA* salina , vel blande volatilia, pro circumstantiis datis, conveniunt. Ita quoque

In ULCERIBUS &c.

Ultimo , cum *DIAPHORETICA* & *SUDORIFERA* , quam saepissime diffilent mobiliores atque subtiliores nostros humores , non , nisi re bene perspecta , Morbo , Diathesi , atque Circumstantiis ad accuratissimam examinatis , adhibeantur , oportet. Sunt , qui alcalina & chymica in morbis laudant , sunt qui cane & angue pejus vitanda censent : tutiora veruntamen vegetabilia acida videntur. In cunctis maneat usus , tollatur abusus.



P A R S IV.

M O R B I

*Quibus DIURETICA inser-
viunt.*

In ANASARCA & LEUCOPHLEG-
MATIA, pro habitu corporis
emendando, laudantur; pro sco-
po isto, lixivium ex cineribus
absinthii vel genistae &c. vino al-
bo paratum atque similibus, est
egregium.

In ARTHRITIDE vel PODAGRA,
DIURETICA appropriata, in
curando & praeservando: sunt
laudata alcalina tum fixa tum vo-
latilia, v. g. spiritus salis armonia-
ci, spiritus carminans de tribus,
lumbricalia, arcanum duplic. &c.
In

In **CACHEXIA** *primaria*, a cruditatibus primarum viarum atque sanguinis, plus minus correctis.

In **CALCULO** *renum*, in paroxysmo sunt moderata, atque tanto paraciora, quanto dolor urget magis; post paroxysmum vero liberiora, ut tinct. nephritica, spir. carminativus, liquor nephriticus: dicta vulgo lithontriptica, saxifraga, rubia tinctorum, ononis, bardana &c. vel novum illud arcanum nuper in Anglia detectum, si modo non esset usu tam difficile, immo quibusdam intolerabile: tentasse non nocet, in hoc morbo, tam incerti & funesti exitus saepe.

In **DOLORIBUS** quandoque **DIURESIS** convenit.

In **EMPHYEMATE**, quando pus ad vias urinarias vergit, optime conceduntur.

In **FEBRIBUS** *continuis lentis*, bono saepe successu; itemque *catarrhalibus*, praemissis veruntamen in

his, lymphae acrimoniam corrigentibus.

In FLUORE *albo mulierum*, DIURETICA conveniunt, in specie terebinthinata, bals. sulphuris terebinth., balsamus copaivae &c.

In GONORRHOEIS, DIURETICA congruunt : v. g. in *notha* benigna, ex junipero, succino &c. in *virulenta*, ex terebinthina vel bals. copaivae, rubicundo colore cum radicibus alcannae tincto &c.

In HAEMOPTOE, saepe profunt per medicamenta sanguinem & vasa simul inspissantia &c.

In HYDROPE sunt optima, praemissis necessariis universalioribus, eaque ex numero volatilium (si interiora adhuc bona nec aliqua putredine corrupta), ex urinis, lumbricis, bufonibus &c. vel, quod saepe tutius, ex spiritu nitri dulcis largiori copia propinato, & ex acidis.

In HYDROPE *pectoris* quoque specialiter conveniunt.

In ICTERO, morbo declinante, *DIURETICA* optima.

In INFLAMMATIONE & hinc sequente *abscessu* internorum, ubi pus ad *renes* defertur.

In INFLAMMATIONE *renum*, in declinatione veruntamen, pro absterfione reliquiarum, alias nocent, propter irritationem.

In ISCHURIA *renali*, *DIURETICA* essentialia, & in specie, si secretio laesa, a sanguinis grumo: rubia tinctor., hederæ, aq. cerefol. hyperic., sic lap. cancror. cum aceto assumpti, sperma ceti, fuccinata, atque similia vulneraria. Sin a pure obstruente per metastasin, abstergentia, simul, ubi terbinthinata, succi recentes citri, hederæ &c. Sin a muco tenaci, blande stimulantia (praemissis laxantibus) ut salina, tartarus vitriolatus, spir. urinosi, salia volatilia, raphanacea &c.

In ISCHURIA *vesicali*, salina, pro circumstantiarum ratione.

In MENSTRUORUM *nimio fluxu*, ex
ferosiore sanguine.


In PODAGRA ut in *Arthritide* di-
ctum.

In RENUM *inflammatione*, caveas,
ante declinationem morbi adhi-
beas, omnia irritantia nociva, in
morbo tali inflammatorio.

In SCORBUTO vel MALO *hypochon-
driaco*, *DIURETICA* laudem me-
rentur suam, adhibitis salinis variis
specificis, praemisso vomitu.

In TUMORIBUS similiter ex lymphae
vario vitio oriundis, idonea
DIURETICA prodesse possunt.

In *Genere*. Ubi *DIURETICA* appli-
canda sunt, indicatio est, mate-
teriam vel peccantem vel super-
fluum, per ureteres esse evacuan-
dam: quae cum ita sint, hocque
non posset semper tuto fieri; qua-
lis electio medicaminum, & in
quibus morbis haec instituenda,
prudens Medicus attente ponde-
rabit.



P A R S V.

M O R B I

Ibi VENAE SECTIO con-
venit.

in ANGINA *inflammatoria*, idque pro revulsione universali, vel in Saphaena, postmodum in brachio alterutro vel utroque; sic, in statu, Raninae, derivationis gratia, habita semper ratione circumstantiarum.

in ANGINA *aquosa* vel *scirrhusa*, raro locum habet, & caute.

in ANI *inflammatione*, quoque in principio, revulsionis gratia, in brachio fieri potest.

in APHONIA, pro ratione circumstantiarum.

in APOPLEXIAE paroxysmo, large & praemature celebranda, prae-

fertim, in locis calidioribus & subjectis plethoricis &c.

In AGRYPNIA per accidens tantum, auferendo causam occasionalem.

In ASTHMA TE, sed per accidens tantum, ad circulationem sanguinis promovendam, subinde necessaria.

In CASU ab *alto*, & quavis sanguinis congrumatione, mox *VENA SECANDA*, in loco opposito, subjunctis statim resolventibus.

In CATARRHO *suffocativo*, a sanguine in pulmones irruente, aut ibidem stagnante, larga *missio sanguinis* necessaria saepe est.

In CATARRHIS, si subjectum est plethoricum, aut consueta sanguinis evacuatione omissa, suppressa; vel si confestim nimius sit decubitus *catarrhalis*, in quadam parte, tunc saltem *VENAE SECTIO* convenire potest, observando revulsionum & avulsionum regulas.

In CEPHALALGIA, *SECTIO VENAE* brachii, frontis & pro ra-
tio-

tione circumstantiarum saepe utilis, praesertim ubi vitium in vasis sanguiferis nimium repletis : etiam Arteriotomia nobile praesidium est , in malo contumaciori, speciatim *Hemicrania*.

In CEPHALALGIA *scorbutica* incipiente aut saepius recurrente, convenit.

In DIARRHOEA *cruenta* , seu fluxu *hepatico* , ex suppressa quadam sanguinis evacuatione, aut infarctu , aut tumore visceris , *VENAE SECTIO* revulsoria , profusflaminatione.

In DOLORIBUS *generaliter* ; prout circumstantiae requisiverint , convenire potest ; vel *hirudines* ; immo & *haemorrhoidum* apertura &c.

In DOLORE *crurum scorbutico* , incipiente , *VENAE SECTIO* , in brachio interdum mire confert.

In DYSENTERIA Sydenham laudat, ast Ettmullerus contradicit ; & sane sunt casus , ubi maxime prodest.

In EPILEPSIA , a sanguinis quadam suppressione, *VENAE SECTIO*, aut alia quaevis v.g. *haemorrhoidum* apertio conducere potest.

In FEBRIBUS *generaliter*, per se quidem locum non haberet, per accidens vero quam maxime; ut in *plethoricis*, & quibus suppressa consueta quaedam evacuatio: aut qui *VENAE SECTIONE* nimium assueti; vel quibus sanguis vegetior; vel ad ebullitiones sanguinis proni, idque in principio. Sunt qui magis in *benignis*, secus in *malignis* statuunt; sunt qui contrarium asserere conantur; ast in omni *inflammatoria* vel *acuta Febre* maximi usus esse, hodierni pene omnes plerumque conveniunt: magis veruntamen, in calidiore climate ac tempore, quam frigidiore.

In FEBRE *continua acuta*, satis opportune *VENAE SECTIO* in principio quidem, & quavis diei hora; atque adhuc magis in assue-

tis & plethoricis, aut quibus suppressa est aliqua sanguinis evacuatio, atque (si eligere fas est) ubi mitius urget aestus & extra tempus furoris *febrilis*.

In FEBRIBUS *malignis*, a *VENAE SECTIONE* ut plurimum cavendum: si mitior *malignitas*, adjuncta *Febris ardens* vehementior; nec ulla signa criseos alicujus: in subjecto praesertim juvenili, fiat principio morbi; circumspecte vero, nam de corio humano agitur, & *VENAE SECTIONE* male celebrata, orta hinc inde symptomata, saepe indomabilia redduntur, sanguisque deperditus non facile restituitur.

In FLUXU *hepatico*, ceu *Diarrhoea cruenta*, ex suppressa quadam sanguinis evacuatione, aut infarctu, aut tumore visceris, *VENAE SECTIO* revulsoria, pro sufflamine.

In HAEMOPTOE, plerumque in paroxys-

xyfmo, observando revulfionis leges.

In **HEPATIS** *inflammatione*, reliquis praemittenda **VENAE SECTIO**, si exigatur.

In **INFLAMMATIONIBUS** in *gene-re*, pro requisitis circumstantiis, **VENAE SECTIO** ventilatoria, ad impediendum *inflammationis* incrementum, omnino subinde concedenda: atque ubi revulfione opus est, minime negligenda.

In **INFLAMMATIONE** in specie v. g. *Intestinatorum*, in brachio, revulfionis gratia instituitur; ut & in *Ani inflammatione*, interdum repetitis vicibus; similiter, *Mesenterii*, sed hic juvat *haemorrhoidum apertio* per hirudines; saepe autem in *Ventriculi inflammatione* cautela opus, atque parcius adhibenda &c.

In **ISCHURIA renali**, levis **VENAE SECTIO**, pro exigentia, adhiberi potest.

In **LOCHIIS retentis**, **VENAE SECTIO**

TIO saepe , eaque in pede , si parcius fluant.

In **LOCHIORUM** *fluxu nimio* , in brachio institui potest.

In **LUXATIONE** , si supervenerit inflammatio , tunc in loco opposito fiat.

In **MALACIA & PICA** , ex mensium suppressione orta , habita tamen simul ratione , an plura indicantia adsint.

In **MANIA** , larga **VENAE SECTIO** instituenda , idque saepius iteratim , paroxysmo tamen prius non-nihil cicurato , & furore mitigato.

In **MENSTRUORUM** *nimio fluxu* , **VENAE SECTIO** in brachio , saltem pauca quantitate , pro exigentia , institui potest.

In **MENSTRUORUM** *suppressione* , ex improvise refrigerio vel terrore &c. **VENAE SECTIO** in pede vel crure ; alias aegre fluentibus , ipso menstrui tempore , in brachio fecetur **VENA**.

In MICTU *cruento*, pro scopo revulsorio, vel derivativo, praesertim, quando ex solemni aliqua evacuatione suppressa, malum abortum fuerit &c. tunc *VENAE SECTIO* locum inveniet.

In MORBILLIS & VARIOLIS, in nostro climate parum prodest, quin potius obest *VENAE SECTIO*: interim mox in principio, inque plethoricis & adultis, pro rei exigentia, adhiberi potest.

In ODONTALGIA *graviore*, interdum ad *SECTIONEM VENAE* accedendum.

In OPHTHALMIA *graviore*, pro revulsione, in pede; averfione in brachio; pro derivatione, optima, in fronte.

In PARALYSI, ex suppressione aliqua sanguinis, *VENAE SECTIO* necessaria.

In PALPITATIONE *cordis*, in subiecto, praesertim, plethorico, sic, ubi suspicio sanguinis grumosi vel polyposi, circa *cor*; vel si suppressa

sa quaedam solemnis evacuatio.

In PERIPNEUMONIA , contendunt quidam , non opus esse *VENAE SECTIONE* ; verum enim vero, quam saepissime, curatos fuisse aegrotantes , sola *missione* largiori *sanguinis* constat ; hinc ea , pro ratione circumstantiarum , in brachio instituenda est.

In PHRENITIDE , administranda *VENAE SECTIO*, pro effervescentia (sic dicta) sanguinis compescenda , atque simul ejus stagnatione resolvenda : huic subjunguntur varia, vel succi acidi, nitrosi , immo bezoardica , sulphurea, antimonialia &c.

In PICA & MALACIA , vide sub *Malacia*.

In PLEURITIDE , per accidens , atque pro conditione personae ; si v. g. plethorica , tunc repetitis vicibus saepe instituenda , idque pro scopo revulsionis : in pede , si est *Pleuritis* (ut dicitur) ascendens ; averfionis gratia , in pede oppos-

LIBRO DE UNIVERSALIUM USU.

posito lateri dolenti , in descendente ; in brachio vero opposito , si est ascendens *Pleuritis* ; propinando postea , specifica , vel universaliter , diluentia & resolventia.

In PRUNELLA, apertio *VENARUM* raninarum mature instituta , bona.

In RENUM *inflammatione* , pro revulsione in brachio ; ac averfione in pede : forte , *haemorrhoidum* apertio , proficua valde.

In SALACITATE *nimia* , praeter dietam parcam , jejunium , *VENAE SECTIO* , eaque repetita conducit.

In SOPOROSIS *affectibus* , *VENAE SECTIO* averforia & derivatoria , in subiecto idoneo.

In, STRANGULATIS , sanguine in faucibus stagnante , sic in *suffocatis*.

In SYNCOPE ex *terrore* , ex *mensium suppressione* &c.

In

In VARIOLIS uti dictum in MOR-
BILLIS.

In VERTIGINE, per accidens, in
plethoricis, evacuatione solita
suppressa, athletice sanis, vita
sedentaria assuetis.

In VOMITU *sanguinis*, revellendo &
& avellendo *missio sanguinis*, sic
per hirudines *haemorrhoidibus* ap-
plicatas, ne ventriculus sangui-
nis copia obruatur &c.

UNIVERSALIS *indicatio* hic: Subje-
ctum plethoricum; sanguinis mo-
tus nimius; inflammationis signa
urgentia, consuetudo, scopus aver-
forius, derivatorius & revulforius;
suppressio, stagnatio sanguinis, &
quae his affinia.





P A R S VI.

M O R B I

*Quibus CLYSTERES opi-
tulantur.*

In ALVI *retentione*, CLYSTERES
ex emollientibus, addita tere-
binthina, vel ejus oleo in affectu
nephritico, profunt.

In ANI *inflammatione*, CLYSTER
leniens & emolliens necessarius, si
faeces induratae, aut metus in-
durationis adsit.

In APOPLEXIA saepe CLYSTER
acer stimulans, similibusve in mor-
bis.

In ARTHRITIDE, CLYSMATA,
in ipso paroxysmo, *anxietates* prae-
cordiorum optime leniunt.

In

In CALCULO *renum*, urgente paroxysmo, *CLYSTER* aut emolliens aut anodynus, optime convenit, additis (secundum quosdam) convenienter terebinthina & sale volatili succini &c.

In CATARRHO *suffocativo*, a sanguine in pulmones impetuosius influente, aut ibidem stagnante, *CLYSTER* acrior.

In CARDIALGIA a *flatibus*, aut *exhalationibus*, ex effervescentia humorum in intestinis, *CLYSTER* ex carminantibus.

In CHOLERA, lenientes v. g. ex lacte.

In COLICA, malo in intestinis crassis haerente praesertim, immo si esset in ventriculo; revulsorio stimulo; idque mitius, ex emollitientibus aut carminantibus; vel fortius, ex *purgantibus*, praesertim in *humorosa*; in *convulsiva* vero, anodynus, & leniter demulcentibus &c.

In DIARRHOEA, potissimum in de-

clinatione, abstergendo.

In DYSENTERIA, raro quidem, idque saltem, ubi fordes eluendae, acrimonia temperanda, necessaria consolidatio.

In DYSURIA, *CLYSTERES* nunc blande stimulantés; nunc lenientes, crebro usurpandi, quando alvus contumacior.

In EPILEPSIA, pro exfuscitatione, acres saepe.

In FEBRIBUS *generaliter*, pro abdominis affectibus mitigandis, aut aestu levando, praesertim capitis, aliisque symptomatibus; abstinendo tamen in naturae motu critico.

In FEBRIBUS *continuis*, pro alvo fluida servanda, urgentibus praecordiorum & abdominis symptomatibus, aestu sanguinis, & ad impediendam translationem organi humorum ad caput, *CLYSTERES* admittuntur.

In FEBRIBUS *intermittentibus*, ubi copiosi flatus aut ardores, aliaque

que abdominis symptomata: v. g. vomitus nimius; anxietates, contumacior alvus, dolores in centro mesenterii, circa vertebrae lumbares, satis sunt proficui, idque leniter abstergentes, aut carminantes.

In FEBRIBUS *malignis*, si primarum viarum obstructio exigat, temperata adhibeantur.

In HEPATIS *inflammatione*, aliisque internis, ubi pus ad intestina fertur, blandis *CLYSTERIBUS* intestina abstergenda.

In HERNIA *confirmata* (minus in recenti, propter *CLYSTERIS* pondus) carminantes, emollientes, praecipitantes, pro ratione affectus.

In HYDROCEPHALO, *CLYSMATATA*, infantibus aequae ac adultis, egregie profunt.

In HYSTERICA *passione*, *CLYSTERES*, ex speciebus aromaticis carminativis, boni.

In ILEO, *CLYSTERES*, emollientes

& abstergentes, praemature adhibiti.

In INFLAMMATIONE *intestinorum*, si alvus obstructa, molles extemporanei fiant, quia malum praeceps.

In ISCHURIA *renali*, *CLYSTERES* terebinthinati, saepe urinae secretionem promovent.

In ISCHURIA *vesicali*, primo quidem blande emollientes, postmodum etiam acres, ut irritata alvo, per consensum vesica stimuletur.

In MESENTERII *inflammatione*, *CLYSTERES* lenientes, abstergentes, emollientes, anodynii, pro causarum occasionalium ratione, injici possunt, praesertim, quando per alvum purgari incipit abscessus.

In RENUM *inflammatione*, lactea, item terebinthinata, serum lactis cum nitro, vel simile injiciatur.

In SCORBUTO & MALO *Hypochondriaco*, *CLYSTERES* emollientes & nutrientes, carminantes &

& subinde, ex lixiviis vel lacte & sapone &c. interdum fatis profunt.

In STRANGURIA, malo contumaciori, *CLYSTERES* emollientes & anodynii. v.g. ex lactis fero, decocto cum herbis emollientibus.

In TENESMO, pauca tantum quantitate.

In VENTRICULI *inflammatione*, convenienter injici possunt *CLYSTERES*.

In VERTIGINE *crebriore* & *vehementiore*, *CLYSTERES* fatis acres, quales in *Apoplexia* & *Epilepsia* usurpantur, bene procedunt.

In VESICAE *inflammatione* & *ulcere*, *CLYSTER* anodynus ex lacte, aut simul cum nitro.

In UTERI *hydrope*, *CLYSTERES* fortiores, etiam vaginae *uteri* injici possunt.

UNIVERSALITER *CLYSTERES* applicari possunt, ubi intestina sordibus liberanda, abstergenda ac

mundanda sunt , nec minus, ubi stimulatione eorundem opus est, acubi purgationi praeferri debent, & similibus.



P A R S VII.

M O R B I.

Quibus OPIATA &c. succurrunt.

In AGRYPNIA conferre possunt *OPIATA*, refrigerantibus & humectantibus subactis , junctis & mixtis , in parva autem dosi & partitis vicibus exhibita, & contraindicantium ratione habita.

In ANGINA praesertim *maligna* quandoque, sudoriferis mixta.

In APETITU *nimio* , FAME *canina* nempe, caute tamen, aliis fociata.

In ASTHMATE praecipue SICCO
con-

convulsivo, ante & in paroxysmo, appropriatis mixta, hoc urgente spirituum impetu.

In ARTHRITIDE & PODAGRA, *OPIATA* dolorem quidem sistunt, sed motum naturae impediunt; ob id caute nec unquam sola, sed purgantibus, vel sudoriferis ut specificis, mixta utenda.

In CALCULO *renum*, sublati primo impedimentis & evacuatis primis viis, & urgente doloris *nephritici* ferocia, *OPIATA* appropriatis mixta, usurpari possunt.

In CARDIALGIA, *OPIATA* mixta necessariis, bona.

In CATARRHO *suffocativo*, a causa interna, v.g. lymphæ tenuiori & acriori, vel fibras pulmonum aut laryngis vellicante.

In CATARRHIS *quibusvis* etiam, praefertim, si singularis lymphæ acrimonia concurrat, *OPIATA* profunt, mixtis appropriatis, sudorem promoventibus.

In CEPHALALGIA, in- & externe

NARCOTICA, mire saepe juvant, sed sunt periculosa, ob id caute exhibenda, atque gradatim a minima dosi incipiendo: extrinsece vero noli futuris admove-
re.

In *CHOLERA* praesertim viribus adhuc praesentibus, alias quibusdam *OPII* dosis minuenda, & distributive absque omissione porrigenda.

In *CHLOROSI* saepe conducunt.

In *COLICA convulsiva & spasmodica* (in *humorosa* vix, nisi dolor urgeat humoresque sint tenuiores) plane necessaria, appropriatis nervinis mixta: si vero in *humorosa* plane exigatur, non nisi post purgantia, aut purgantibus mixta adhibeantur, & non nisi in summa necessitate, purgantibus praemittenda sunt.

In *DIABETE*, praecipue notha interpolatus *NARCOTICORUM*, ad irritationem renum & nimiam secretionem, vel colliquefactionem impediendam, non incongruus
usus.

In

In DIARRHOEA , ad sopiendum acutum irritationis sensum , illa diascordiata Fracastorii, Sylvii &c. conveniunt.

In DOLORIBUS in *genere* , *NARCOTICA* in- & externe adhibita primatum ducunt , attamen parcius & cautius adhibeantur atque praemissis praemittendis , & appropriatis debitis sociata.

In DYSENTERIA , maxime , idque melius vesperi, additis convenientibus sudoriferis, acre absorbentibus, aut si opus est, leni abstergente , & confortante fibras , uti rhabarbaro &c.

In EPILEPSIA , *OPIATA* mixta debitis , praemissis universalibus, bona.

In FAME *canina* , caute tamen, aliisque sociata vel subjecta.

In FEBRIBUS *generaliter* , cautius & non nisi necessitate urgente & in incremento potius, additis convenientibus , in *intermittentibus*, prius praemissis praemittendis.

In FEBRIBUS *intermittentibus*, lenissimo usu saltem, & febrifugis usitatis fociata, praemissisque universalibus digestivis, & gravioribus symptomatibus urgentibus, caeterum caute.

In FEBRIBUS *continuis*, idque *acutis* non incongrua, debito tempore, viribus adhuc praesentibus, ad orgasmum humorum, spirituumve furorem praemature inhibendum, blande papaverina, laudanum *opiatum*, sed moderate.

In FEBRIBUS *malignis* applicantur cum successu, idque in morbi augmento, cum sudoriferis (praesertim si anxii & inquieti sunt aegri), vel etiam post sudores, pro robore & quiete aliquali causanda, cum julapiis & mixturis convenientibus, propinando.

In FLUXU *hepatico* sive DIARRHOEA *cruenta*, OPIATA vulnerariis, & saepe adstringentibus mixta.

In HAEMOPTOE, OPIATA perquam

quam sunt proficua , in specie semen hyoscyami pptum &c.

HAEMORRHAGIA , *OPIATA*, inspissantibus & consolidantibus mixta, generale remedium.

HEPATICO *fluxu* , vide sub *Fluxu*.

HERNIA , externe *ANODYNA*, sub forma fots , in irritationis sensu.

ILEO , praesertim si irritatio superet obstructionem; si contra, purgans praemittendum , in *inflammatione* vero intestinorum, magis fugienda.

INFLAMMATIONE omni , urgente summa necessitate , cum omni cautela.

INFLAMMATIONE *intestinorum*, dolore urgente, appropriatis miscenda *anodyna*.

ISCHURIA *vesicali* , si ex sphincteris suppressione , volatilia *OPIATIS* mixta, convenire possunt.

LIPOTHYMIA & SYNCOPE,
ex

ex spirituum nimia dissipatione,
vel eorum, in impetus convulsi-
vos, pronitate, sed parva dosi,
acidis saepe fociata.

In MANIA, *OPIATA* conveniunt,
ad spirituum motum mitigandum,
excellere videntur, sulphurea mine-
ralia *anodyna*.

In MENSTRUORUM *fluxu nimio*, *OPIATA* sistunt ut plurimum, in-
ter quae bona, diascordium cum
vehiculo acido.

In MICTU *cruento*, est electuarium
Haelidae Paduani laudatum qui-
busdam.

In MORBILLIS & *Variolis*. Vide in
Variolis.

In ODONTALGIA, ex laudano,
OPIATA (praemissis vero tutius
universalibus) interdum opti-
ma.

In PHRENITIDE, saepius etiam, de-
bito cum moderamine, convenire
possunt.

In PHTHISI, *OPIATA* valde con-
ducunt, & quidem larga dosi.

In

In PLEURITIDE & *Peripneumonia*, ad doloris ferociam compescendam, in principio, ex papavere rhoead. conducunt.

In RAUCEDINE *recenti*, à causa externa, *OPIATA*, cum lenientibus & temperantibus irritationem & profluvium lymphæ sistunt; item a causa interna, praemissis, si opus fuerit, purgantibus.

In SATYRIASI, *OPIUM*, v.g. cum camphora & aceto rutaceo, saepius usurpanda.

In SINGULTU, ad irritationem & spasmus sistendum, quandoque optima, praesertim appropriatis mixta.

In STERNUTATIONE nimia, odor *OPII*, vel oleum rosarum, *OPIO* impraegnatum, maximi usus esse constat.

In SEMINIS nimis cita *ejaculatione*, *OPIATA* conveniunt, si nempe vitium, ex nimia spirituum agilitate, & turgescencia seminis.

In **TENESMO**, ad spasmodicam vellicationem sistendam, praesertim vero, si ex consensu.

In **TUSSI ferina**, & sudoribus nocturnis tabidorum, ad mitigandum & cohibendum, optima sunt **OPIATA**.

In **TUSSI humida**, ab acri vellicante, ad irritationis sensum; in *pectorali* autem, nonnisi post potionis mucilaginis evacuationem.


In **STOMACHALI sicca ferina**, conveniunt apprime, aut ejus loco temperata, praemisso vomitorio.

In **VARIOLIS & Morbillis** perquam proficua esse possunt, in specie vesperi, adhibita debita cautela, non enim oportet facile, in his & similibus morbis periculosis, ad **NARCOTICA** festinare fortiora.

In **VERTIGINE**, **OPIATA**, anti-épilepticis fociata, laudanda.

In **VESICAE inflammatione** & ulcere subsequente, *anodyna*, pro exigentia rei, & doloris ferocitate usurpari possunt.

n VOMITU *nimio*, praesertim, causa in stomacho, & pylori vel superioris orificii nimia sensibilitate existente, *OPIATA* maxime profunt. Tandem, *OPIATA* fortiora, omnium cum prudentia adhiberi debent. In omni dolore, *SOPORIFERA* summa remedia; quo sunt fortiora, eo cautius: nec minus, in spirituum nimia agitatione. In adultis, tutior, in infantibus, periculosior usus. *malum* plerumque intensile reddunt *OPIATA*, non semper tollunt.



P A R S VIII.

M O R B I

Quibus VESICATORIA &c.
conveniunt.

In APOPLEXIA , PARAPLEGIA
& *similibus* , haec irritamenta, ma-
ximi usus.

In ARTHRITIDE & PODAGRA,
VESICATORIA ex cantharidi-
bus , tam curative quam praefer-
vative, convenire possunt.

In ASTHMATE *convulsivo*, *VESTI-*
CATORIA , scapulis aut brachiis
applicata , subinde multum opis
praestant.

In CATARRHIS *contumacioribus* , &
fere

fere incorrigibilibus, *FONTICULI* & hinc *VESICATORIA*, ad feri evacuationem saepe adhibentur.

CEPHALALGIA *pertinaciori*, ubi malum, ex fero sanguinis, saepe optima sunt *VESICATORIA*, *SETACEA*, praemissis rite universalibus. Ita & ipsum *Trepanum* quandoque institutum fuisse, maximo cum successu, constat.

DOLORIBUS in *genere*, pro ratione circumstantiarum, *VESICATORIA* &c. convenire possunt.

FEBRIBUS *intermittentibus*, carpis manuum applicata saepe conveniunt, idque die intermissionis.

FEBRIBUS *malignis*, ex cantharidibus &c. sunt egregia, idque imprimis in principio status, ubi *cephalalgiae* nimiae, *deliria*, *convulsiones* &c. imminet, ad derivandum; item, quando interiora uruntur, extrema vero frigent, item, ubi

ubi Natura aliquam excretionem molitur, erumpentibus hinc inde maculis, aut iisdem retrocedentibus, in tali casu, optime cruribus, ad pedum plantas, supra vel infra genu, vel brachiis, prope carpos, aut prope axillas, etiam circa nucham (sed hoc vix, nisi in *soporosis affectibus*) applicantur, utendo, vel cantharibus, vel sinapi, raphanis acrioribus, cum fermento, aceto, similive compositis.

In FEBRE *petechiali* maxime conveniunt, praesertim quando retrocesserint maculae, ut & in *Variolis* & *Morbillis*; sic in *Peste*, optima esse compertum.

In HAEMORRHOIDUM *fluxu* & *dolore habituali*, FONTICULUS in tibia optimus, & maximi usus quandoque.

In OPHTHALMIA saepe proficua, idque in nucha praecipue, & hinc pone aures posita.

In

n PODAGRA , uti dictum in *Arthritide*.

n SOPOROSIS *affectibus* , *VESICATORIA*, *sternutatoria* & similia, non incongrua.

n VARIOLIS & MORBILLIS , si retrocesserint , aut aegre erumpant, bona.

UNIVERSALITER , *VESICATORIA*, *FONTICULI*, *SETACEA*, stimulantia, irritantia , avellentia & derivantia , dicenda cum sint, electio , applicatio & usus , sponte patent.





P A R S IX.

M O R B I

Quibus *PTTALISMUS*
prodest.

In APHONIA, maxime per *MAS-
TICATORIA*, vel similia.

In FLUORE *gallico mulierum*, cum
successu convenit, ex melle, aloë,
mercurio dulci, decocto guajaci,
vel lignorum, & vaporum, *SALIVAM* per os derivantium, cum
regimine.

In LUE *Venerea*, appropriate con-
venit, antecedenti paragrapho,
recensitus, cum variis specificis,
pro re nata, in debita dosi, cum
spectantibus adminiculis & caute-
lis.

In

n PARALYSI *privativa*, ex causis externis, praesertim, ex metastasi materiae morbificae, in malo contumaciori, *SALIVATIO* convenire potest.

n OSSIUM *morbis variis*, per mercurium dulcem, vel guajacum.

n VARIIS *glandularum morbis* &c. glandulas obstruentibus, materia viscida irresolubili, ordinariis remediis non cedente.

n VULNERIBUS *profundis*, externe quidem curatis, ubi in musculis, vel profundae tunicae adiposae, immo & periossteum laborant, atque peccante irresolubili materia replentur, dicta maxime, vel nihil, juvant.

ULTIMO, cum nullum universalius resolvens, Mercurio dulci, (vel aliquo modo, decocto Guajaci) fit inventum, cujus usu omnes humores, immo & quaevis glutinosa instar Lymphae exspuuntur, hinc in & post mercurii usum, debite renovatur, applicatione ef-

culentorum blandissimorum, aeger; ac, si solida nondum sunt corrupta, novus restituitur. Quamobrem, si cunctis cedere remediis, denegat Natura, tamen, his vinci, vel nullis, observamus.

PTARMICA, SUFFITUS & similia rarius usum habentia, nec in nostro sensu adnumerantur universalibus, ad opus contrahendum, omittuntur: unicuique semper licet, quae deficere putat, addere & defectum supplere; enumerandae enim alias forent, Curae speciales omnes. Haec hinc inde sufficere, nullus dubito.

EPILOGUS.

En, opus absolutum: in quo, quae ab Hippocrate, Galeno, Avicenna, Sydenham, Sennerto, Sylvio, Pisoni, Riolano, Bellino, P. Alpino, Riverio, Rolfincio, Ettmullero, Freind, Doleo, Drelincurtio, Dekkers, Hoffmann, Stahl, Boerhaave, de Gorter, aliisque summis, in Praxi, luminariis, didici, legi, colligere, contrahere & in exiguo fasciculo includere, tentavi. Pauca addidi admodum, hominibus debetur, praefatis & plurimis, tantae experientiae ac auctoritatis Viris. Quandoquidem, non unius, aut mille hominum est, tanta observare & detegere, illis, me imparem, multisque parafangis inferiorem esse sentio: quamobrem, hos ulterius consulendos, suadeo, ac consulo; meque unius ejusdem vestigia,

ubique premere, non assentio. REMEDIA, quae paucissima admodum largitus fui, in horum monumentis, uberrime & largissime detegenda. Dicam oportet, me, de remediis, minus semper sollicitum fuisse, quam de *causis Morborum*, ex certis phaenomenis cognoscendis, non neglectis coindicantibus: his enim *cognitis* atque *indicatis*, *remedia* praesto sunt. Magnum, credite, Medici hoc est arcanum, & maximi in Praxi moliminis: *Morbum* bene perspectum habere; ipsius *causam* resolutam ac notam; quid *faciendum* notum: quo simplicius eo melius, gaudet dives & perspicax Natura maxima simplicitate. Sequamur tantum Naturam ducem & non errabimus. Datis vero dictis, pharmaca undique affluent, atque quisque Praxi dicatus, facile sibi catalogum medicamentorum & formularum formabit.

Odi, veruntamen dicam oportet, in morbis curandis, certum quoddam, formularum memoriae mandatum syntagma.

tagma. Nihil pene exitius , empiricorum praxi nudâ , arti accidere posse , omnis sincerus Artifex morbi agnoscat. ex.gr. Pro dolore ventris, recipe spir. anisi duplicat. , cort. auran-
tior.: sp. cornu cervi, pro capitis dolore, spir. sal. armoniaci odorem , similesve, funesti eventus quam saepissime praescriptiones , ab ignaris verae scientiae Medicae , cum intolerabili histrionum jactantia , ventilatae. Hinc tantae lachrymae!

Nec minus illis grandiloquis , in hirundinum museo edoctis, os obturandum censeo, penes quos est, praesentia omnia aequae ac futura, ex sola Urinae inspectione, certo certius velle indicare : Quandoquidem etenim , & ipsum experimentum , magnopere sit saepius fallax , quanto magis judicium erit difficile. Plurima nos posse inde, cum certitudine evidenter colligere, non obloquor, id ipse etenim comprobavi , in hoc opere: non vero omnia aequae sunt certa ; immo, in maximis

saepe caecutimus & rudes sumus. Non juvat hic, gloriosius plurima, de se ipso praedicare, garrere multa, ac gastronautiam introducere, nulli salutarem. Hic Rhodus, hic saltus: parum dicere multum probare oportet; atque verecundus esse in securitate danda nimia, infirmitatis humanae suae conscius.

Natus homo de muliere, multis miseriis, anxietatibus atque debilitatibus, licet tantis elationibus superbiat, premitur. Veruntamen concessit summus rerum Arbiter, unicuique malo medelam suam, ac voluit, homines plurimum profint bona voluntate, immo & obsint inscitia sua, hominibus. Ipse creavit Medicum, & e terris Medicamenta; vir bonus igitur ac sapiens, minime contemnere ea debet. Atque, quamvis perpauca subiecta habeantur potestati nostrae, in re dubia, probabiliorē arripere sententiam, nihil vetat, & ea medicamenta adhibere, unde, magnas utilitates nos adipisci, quàm saepissime experti fuimus.

Quan-

Quandoquidem igitur , haec ita esse , compertum sit , ne dicat quis , sine Medici adjumento peritioris ac prudentioris , multas felices curas efficere quendam potuisse : nihilominus ne credat ullus , calamitates hominum , sublatas iri , sola prudentia humana ; altioris indaginis utique hanc rem esse , assero.

Adhuc semel , universalem revelatam esse & detectam medicinam , nego , specialem vero , absolute talem , paucam admodum agnosco : sic dicta specifica , omnibus accepta , ad depellendum morbum , esse ejicienda , minime concedo ; tantum abest , ut potius impellerem artis filios , esse potius debito tempore ac loco adhibenda , atque in opem revocanda. Obtinet eheu ! nimium in arte Phoebea : tentasse non nocet ; sit modo pro viribus ex corde toto , ad summi Numinis , Medicorum & medicaminum directoris unici , authoris Naturae

turae gloriam, proximi emolumentum, propriamque salutem: hic est verum candidi Medici scopus, atque

F I N I S.



CATALOGUS

Librorum Medicorum,

*Qui apud GERARDUM POTVLIET
impressi, vel majori copia venales
habentur.*

Prosper. Alpini Historia Naturalis Aegypti, five de Plantis Aegypti cum Observationibus & Notis J. Veslingii 4to 2 vol. cum mult. fig.

———— Idem Ch. Max.

———— Medicina Methodica 4to.

———— De Praefagienda Vita & Morte 4to.

F. Hoffmanni Opera omnia Medica Practica 6 vol. Fol.

S. Coulet de Ascaridibus & Lumbrico lato, 8vo cum fig.

C. Pisonis Observationum & Consiliorum de Morbi Affectibus cum Praefat. H. Boerhaave 4to.

N. Pisonis de Cognoscendis & Curandis Morbis 2 vol. 4to.

H. Boerhaave Elementa Chemiae cum Opusculis omnibus Lugd. Bat. 2 vol. 4to.

J. M. Lancisii de Motu Cordis & Aneurismatibus, cum fig. 4to.

J. Sanctorini Observationes Anatomicae Opt. edit. cum fig. 4to.

G. Ballonii, Opera omnia 4 vol. 4to.

A. M. Valsalva de Aure Humana cum fig. 4to.

J. H. Schulzii Historia Medicinae 4to.

B. Bianchi Historia Hepatica 2 vol. cum fig. 4to.

Dureti Comment. in Coacas Hippocratis, curante
A Peleryn Chrouet, edit. Opt. fol.

C A T A L O G U S.

M. Ettmulleri Opera omnia Medica Theorico-practica 4 vol. fol. edit. opt.

L. Riverii Opera omnia Medica edit. opt. fol.

Prosper Martianus in Hippocratem.

Aretaei Cappadocis Gr. & lat. curante H. Boerhaave.

H. Fabritii ab Aquapendente Opera Chirurgica cum fig. fol.

———— Opera omnia Anatomica & Physiologica cum fig. fol.

Clerici Historia Latorum Lumbricorum, cum fig. 4to.

D. L. Heisteri Institutiones Chirurgicae, cum fig. 2 vol. 4to.

C. Magati de Rara Medicatione Vulnerum 2 vol. 4to.

C. Hoffmanni de Medicamentis Officinalibus 4to.

F. Hoffmanni Consultationes & Responsiones Medicinalium 2 vol. 4to.

———— Pathologia Medico-practica.

Baglivii Opera omnia Medico-practica 4to.

Memoires de l'Academie Royale des Sciences, contenant les Ouvrages Adopt, 6 vol. avec fig. 4to.

Histoire de la Medicine par D. le Clerc 4to.

T. Sydenham Opera omnia & Musgrave de Arthritis de 2 vol. 4to.

J. B. Helmontii Opera omnia 4to.

R. Morton Opera omnia & Harris de Morbis Infantum, Cole de Secretione Animalis, Lister de Morbis Chronicis, Sydenham Processus integri 2 vol. 4to.

J. H. Degneri de Turfis Hollandiae 8vo.

———— de Dysenteria 8vo.

La Chirurgie complete par de la Motte 4 vol. 8vo.

Pharmacopoea Londinensis 8vo.

Hollerii in Aphorismos Hippocratis 8vo.

J. Hovii de Oculo & Thebesii de Circulo Sanguinis in Corde cum fig. 8vo.

J. J. Wepfferi Cicutae Aquaticae cum fig. 8vo.

C A T A L O G U S.

- P. Morelli Methodus Præscribendi. 8.
Traité des Maladies des Yeux, par Saynt Yves. 8.
Peyeri Parefga Anatomica & Observatio circa Ura-
chum, cum fig. 8vo.
C. Havers de Offibus & Heyne tentamina Chirur-
gica, cum fig. 8vo.
N. Tulpii Observationes Medicinæ. 8vo.
J. Lommi Observationes. 8vo.
-- ——— de Febribus.
-- ——— de Sanitate Tuenda.
F. Hoffmanni Medicus Politicus. 8vo.
Hecquet Novus Medicinæ Conſpectus. 2 vol. 8vo.
——— *Traité de la Peste*.
T. J. Leenhof Enchiridium Medico-Practicum. 8vo.
R. Lowerde Corde, de Motu, Colore & Transfusio-
ne ſanguinis. cum fig. 8vo.
J. Allen Synopſis Univerſa Medicinæ practicæ. 8vo.
J. Berengarii de Fractura Cranii. cum fig.
F. Hoffmanni Opuscula Phyſico Medica. 2. vol. 8.
-- ——— Conſultationes & Reſponſio 3. vol. 8vo.
La Maniere d'Amolir les Os, par Papin. avec fig.
Pathologie du Chirurgie, par Verduc, 2. vol. 8.
Schelhamer de Nitro. 8vo.
Bartholini Anatomia & Wallæus de Motu Chyli,
cum fig. 8vo.
Operations de Chirurgie, par Dionis. 8. avec fig.
F. Bartholini Epistolæ Centuria Medicinalium cen-
turiae IV. 6. vol.
. Douglas Bibliographia Anatomica. 8vo.
——— Descriptio Muſculorum. 8vo.
——— Descriptio Peritonæi. 8vo.
D. W. Trilleri de Pleuritide. 8vo.
. Pontederæ Anthologica accedunt ejusdem Differ-
tationes XI. 4to.

